

レジメン番号	レジメン名	レジメン内容
05A0003	大腸FOLFIRI外来用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0004	大腸FOLFIRI入院用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0005	大腸mFOLFOX6外来用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0006	大腸mFOLFOX6入院用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0008	大腸アバサチン+FOLFIRI外来用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0009	大腸アバサチン+FOLFIRI入院用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0010	大腸アバサチン+mFOLFOX6外来用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0011	大腸アバサチン+mFOLFOX6入院用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0020-1	大腸セツキシマブ単剤（初回）	Cet:250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1 1w毎
05A0020-2	大腸セツキシマブ単剤（2回目以降）	Cet:250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1 1w毎
05A0020-3	大腸セツキシマブ単剤（500mg/m ² ）（初回）	Cet:500mg/m ² day1 2w毎
05A0020-4	大腸セツキシマブ単剤（500mg/m ² ）（2回目以降）	Cet:500mg/m ² day1 2w毎
05A0024-1	大腸セツキシマブ+CPT-11（隔週）（初回）	Cet: 250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1,8 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-2	大腸セツキシマブ+CPT-11（隔週）（2回目以降）	Cet: 250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1,8 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎

05A0024-3	大腸セツキシマブ+CPT-11(500mg/m ²)(初回)	Cet: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-4	大腸セツキシマブ+CPT-11(500mg/m ²)(2回目以降)	Cet: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0025	大腸CPT-11単剤 (隔週)	CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎 通常のCPT-11を2w毎に2-3回投与し、その後3w休薬
05A0026	大腸XELOX	L-OHP:130mg/m ² day1 カペシタビン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで、カペシタビン2000mg/m ² /dayを1日2回朝・夕食後に経口投与する。
05A0027	大腸アバスタチン+XELOX	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 カペシタビン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A0027-2	大腸アバスタチン+カペシタビン	Bev:7.5mg/kg day1 カペシタビン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A0028	大腸IRIS	CPT-11:100-125mg/m ² day1,15 S-1:80mg/m ² day1-14 4w毎
05A0030-1	大腸パニツムマブ単剤 (初回)	Pmab:6mg/kg day1 2w毎
05A0030-2	大腸パニツムマブ単剤 (2回目以降)	Pmab:6mg/kg day1 2w毎
05A0034	大腸パニツムマブ+CPT-11	Pmab:6mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0035	大腸アバスタチン+CPT-11	Bev:5mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0036-1	大腸アバスタチン+SOX	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎
05A0036-2	大腸アバスタチン+SOX (L-OHP不耐)	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHPは不耐のためOff S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎
05A0040-1	大腸セツキシマブ+FOLFIRI (初回) (ヘパフラッシュ)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-2	大腸セツキシマブ+FOLFIRI (2回目以降)(ヘパフラッシュ)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎

05A0040-3	大腸セツキシマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(初回)	Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0040-4	大腸セツキシマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(2回目以降)	Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0041-1	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用(初回)(ヘパフラッシュ)	Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP1:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0041-2	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用(2回目以降)(ヘパフラッシュ)	Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP1:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0042	大腸パニツムマブ+FOLFOX(ヘパフラッシュ)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0043	大腸パニツムマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0044	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6外来用(2回目以降)(ヘパフラッシュ)	Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP1:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0044-1	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(初回)	Cet: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP1:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0044-2	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(2回目以降)	Cet: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP1:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
05A0045	大腸アバスタチン+FOLFOXIRI入院用(プロイメンド)(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A0046	大腸アバスタチン+FOLFOXIRI外来用(イメンド)(ヘパフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: day1 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A0048	大腸ラムシルマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(イメンド)	Ram:8mg/kg day1 ① ② ③:200mg/㎡ day1 ④/⑤:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
05A0049	大腸ラムシルマブ+FOLFIRI(ラムシルマブ単独)	Ram:8mg/kg day1 ① ② ③:200mg/㎡ day1 ④/⑤:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
05A0051	大腸アバスタチン+IRIS	Bev:5mg/kg day1,15 CPT-11:100mg/㎡ day1,15 TS-1:80mg/㎡ day1夕~day15朝 4w毎
05A0059	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎

05A0060	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0061	大腸XELIRI+Bev	Bev:7.5mg/kg day1 CPT-11:200mg/m ² day1 カベシタピン:1600mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のCPT-11投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタピン1600mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。 ※UGT1A1の検査を行うこと
05A0063	大腸ペバシズマブ+TAS-102	Bev:5mg/kg day1,15 TAS-102:70mg/m ² /day (35mg/m ² /回 分2) day1-5、day8-12 4w毎
05C0001	小腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C0002	小腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
14A0004	肛門管CDDP+5FU(75-1000) (CRT用) (プロイメンド)	CDDP:75mg/m ² day1 5-FU:1000mg/m ² day1-4 4w毎 4コースまで実施可能
14A0005	【医師限定】 肛門管5FU+MMC (無償提供) (CRT)	5-FU:1000mg/m ² day1-4 MMC:10mg/m ² day1 4w毎 4w1コースで、CRT中はday1とday29の計2コース投与する。