

レジメン番号	レジメン名	レジメン内容
1021	骨肉腫 ADR+CDDP ADR3日分割投与	ADR:25mg/m ² day2-4 CDDP:100mg/m ² day2
10A0001-1	肉腫ADR+CDDP (末梢) (イメンド)	ADR:45mg/m ² day1-2 CDDP:60mg/m ² day1-2
10A0001-1b	肉腫ADR+CDDP (末梢) (イメンド)	ADR:45mg/m ² day1-2 CDDP:60mg/m ² day1-2
10A0001-2	肉腫ADR+CDDP (中心) (イメンド)	ADR:45mg/m ² day1-2 CDDP:60mg/m ² day1-2
10A0001-2b	肉腫ADR+CDDP (中心) (イメンド)	ADR:45mg/m ² day1-2 CDDP:60mg/m ² day1-2
10A0002-1	肉腫HD-IFO (末梢) (イメンド)	IFO:4g/body(IFO:12-16 g /m ² ,Max4g/body/day) day1-6 総量20-24g/bodyを標準としている。 投与量が20g/bodyまでの場合、5日間で投与を完了することがある。
10A0002-2	肉腫HD-IFO (中心) (イメンド)	IFO:4g/body(IFO:12-16 g /m ² ,Max4g/body/day) day1-6 総量20-24g/bodyを標準としている。 投与量が20g/bodyまでの場合、5日間で投与を完了することがある。
10A0003-2	肉腫MTX (中心) (イメンド)	MTX:10-12g/m ² day1,8 MTXは250-300mg/kgで計算も可
10A0004-1	肉腫ADR+IFO (末梢) (イメンド)	ADR:30mg/m ² day1-2 IFO:2g/m ² (Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可 (例: 40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A0004-2	肉腫ADR+IFO (中心) (イメンド)	ADR:30mg/m ² day1-2 IFO:2g/m ² (Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可 (例: 40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A0004-2c	肉腫ADR+IFO (中心) (イメンド)	ADR:30mg/m ² day1-2 IFO:2g/m ² (Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可 (例: 40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A0006-1	肉腫VAdrC (末梢) (イメンド)	CPA:1000-1200mg/m ² day1 ADR:30-37.5mg/m ² day1-2 VCR:1.5mg/m ² day1 VCRはMax2mg/body
10A0006-2	肉腫VAdrC (中心) (イメンド)	CPA:1000-1200mg/m ² day1 ADR:30-37.5mg/m ² day1-2 VCR:1.5mg/m ² day1 VCRはMax2mg/body
10A0006-2b	肉腫VAdrC (中心) (イメンド)	CPA:1000-1200mg/m ² day1 ADR:30-37.5mg/m ² day1-2 VCR:1.5mg/m ² day1 VCRはMax2mg/body

10A0007-1	肉腫IE (末梢)	IFO:2-3g/㎡(IFO:6-9 g /㎡,Max4g/body/day) day1-3(+day4) ETP:100mg/㎡ day1-3
10A0007-2	肉腫IE (中心)	IFO:2-3g/㎡(IFO:6-9 g /㎡,Max4g/body/day) day1-3(+day4) ETP:100mg/㎡ day1-3
10A0008-1	肉腫ICE (末梢)	CBDCA:300mg/㎡ day3 IFO:3g/body day1-3 ETP:100mg/㎡ day1-3
10A0008-2	肉腫ICE (中心)	CBDCA:300mg/㎡ day3 IFO:3g/body day1-3 ETP:100mg/㎡ day1-3
10A0018	肉腫アドリアマイシン単剤 (60mg/㎡)	ADR:60mg/㎡ day1 3W毎
10A0019	肉腫トラベクテジン	トラベクテジン:1.2mg/㎡ day1 3w毎 <投与開始基準>好中球1500/mm ³ 以上、Hb9.0g/dL以上、 血小板10万/mm ³ 以上、アルブミン2.5g/dL以上
10A0020	肉腫P6 protocol (HD-CAV)	CPA:2100mg/㎡ day1-2 ADR:25mg/㎡ day1-3 VCR:0.67mg/㎡(最高3日間合計で2.0mg/body) day1-3 P6プロトコルの1,2,3,6コースで使用 NEUT:500/μL以上,PLT:10万/μL以上で開始
10A0023	肉腫エリブリン	エリブリン: 1.4mg/㎡ day1,8 3w毎
10A0024	肉腫アドリアマイシン単剤(75mg/㎡)(末梢)	ADR:75mg/㎡ day1 3w毎
10A0025	肉腫アドリアマイシン単剤(75mg/㎡)(中枢)	ADR:75mg/㎡ day1 3w毎
10A0026	肉腫VAdrC(中心)(イメンド)(ユーイング肉腫)	CPA:1200mg/㎡ day1 ADR:37.5mg/㎡ day1-2 VCR:1.5mg/㎡(Max:2.0mg/body) day1 ※ADR累積量:375mg/㎡ ※6.7サイクルはADR抜きで実施。 ※2週毎に肉腫VAdrC(中心)(イメンド)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)レジメンを繰り返し、14サイクル行う。
10A0027	肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)	IFO:1.8g/㎡ day1-5 ETP:100mg/㎡ day1-5 ※2週毎に肉腫VAdrC(中心)(イメンド)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)レジメン繰り返し、14サイクル行う。