

レジメン番号	レジメン名	レジメン内容
13B0007	神経膠腫Bev (2W) (単剤)	Bev:10mg/kg day1 2w毎
13B0008	神経膠腫Bev (3W) (単剤)	Bev:15mg/kg day1 3w毎
13B0009	神経膠腫Bev+TMZ+RT (初発:放射線併用)	Bev:10mg/kg day1 TMZ:75mg/m ² 連日投与 2w毎 RT:2Gy/日 週5回 総線量60Gy
13B0010	神経膠腫Bev+TMZ (初発:維持療法)	Bev:10mg/kg day1,15 TMZ:150mg/m ² /日 経口 day1-5 4w毎 TMZ 2クール目以降は忍容性が確認される場合は200mg/m ² /日に増量する
13B0012	神経膠腫PAV	ACNU:80mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (max2mg/body) day8,29 PCZ:100mg/日 朝夕分2 day8-21 6w毎 テトロシド1T朝day9-21 (症状が強い時は2T朝夕) RTを行う場合は、抗癌剤最終投与後6週間以内に開始する
13B0013	神経膠腫Bev+CPT-11	Bev:10mg/kg day1 CPT-11:125mg/m ² day1 2w毎
13D0002	胚細胞性腫瘍CBDCA+ETOP	CBDCA:450mg/m ² day1 ETP:150mg/m ² day1-3 4-5w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
13G0001	嗅神経芽細胞腫CDDP+ETOP	CDDP:80mg/m ² day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
13G0002	嗅神経芽細胞腫CPT-11+DOC	CPT-11:50mg/m ² day1,8,15 DOC:30mg/m ² day1,8,15 4w毎