

レジメン番号	レジメン名	レジメン内容
07A0001	卵巣TC (イメンド)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07A0006	卵巣・腹腔dose dense TC (イメンド)	PTX:80mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC=6 day1 3w毎 6-9コース繰り返す
07A0007	卵巣ドキシル	リボソーマルドキシル:50mg/m ² day1 4w毎
07A0009	卵巣CPT-11	CPT-11:100mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A0011	卵巣ノギテカン単剤	ノギテカン:1.5mg/m ² day1-5 3w毎
07A0012	卵巣GEM単剤	GEM:1000mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A0012AE	卵巣GEM単剤 (副作用予防)	GEM:1000mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A0013	卵巣TN	PTX:175mg/m ² day1 CDGP:100mg/m ² day1 4w毎
07A0014	卵巣BEP(イメンド)	CDDP:20mg/m ² day1-5 ETP:100mg/m ² day1-5 BLM:30mg/body day2,9,16 3w毎 BLMの総投与量は300mgを超えないこととする
07A0014a	卵巣BEP(イメンド)	CDDP:20mg/m ² day1-5 ETP:100mg/m ² day1-5 BLM:30mg/body day2,9,16 3w毎 BLMの総投与量は360mgまで
07A0016	卵巣Bev+TC (イメンド)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body ※手術後28日以内に1コース目を開始する場合にはBev抜き (卵巣TC (イメンド)) で行う
07A0017	卵巣Bev	Bev:15mg/kg day1 3w毎
07A0018	卵巣Bev+ドキシル	Bev:15mg/kg day1 リボソーマルドキシル:40mg/m ² day1 4w毎 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること
07A0020	卵巣Bev+PTX	Bev:15mg/kg day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎

07A0023	卵巣Bev+GC（外来用）	Bev:15mg/kg day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎
07A0023AE	卵巣Bev+GC（外来用）（副作用予防）	Bev:15mg/kg day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎
07A0026	卵巣DC	DOC:70mg/m ² day1 CBDCA:AUC=5 day1 3-4w毎 合計6回
07A0027	卵巣ドキシル+CBDCA（イメンド）	リボソーマルトキシルシン:30mg/m ² day1 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること CBDCA:AUC=5 day1 4w毎