

レジメン番号	レジメン名	コメント
05A0003	大腸FOLFIRI外来用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速)day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0004	大腸FOLFIRI入院用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速)day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0005	大腸mFOLFOX6外来用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0006	大腸mFOLFOX6入院用（ヘパフラッシュ）	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0008	大腸アバスタチン+FOLFIRI外来用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0009	大腸アバスタチン+FOLFIRI入院用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0010	大腸アバスタチン+mFOLFOX6外来用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0011	大腸アバスタチン+mFOLFOX6入院用（ヘパフラッシュ）	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0020-1	大腸セツキシマブ単剤（初回）	Cet:250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1 1w毎
05A0020-2	大腸セツキシマブ単剤（2回目以降）	Cet:250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1 1w毎
05A0020-3	大腸セツキシマブ単剤（500mg/m ² ）（初回）	Cet:500mg/m ² day1 2w毎
05A0020-4	大腸セツキシマブ単剤（500mg/m ² ）（2回目以降）	Cet:500mg/m ² day1 2w毎
05A0024-1	大腸セツキシマブ+CPT-11（隔週）（初回）	Cet: 250mg/m ² （初回は400mg/m ² ） day1,8 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎

05A0024-2	大腸セツキシマブ+CPT-11 (隔週) (2回目以降)	Cet: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-3	大腸セツキシマブ+CPT-11(500mg/m ²)(初回)	Cet: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-4	大腸セツキシマブ+CPT-11(500mg/m ²)(2回目以降)	Cet: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0025	大腸CPT-11単剤 (隔週)	CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎 通常のCPT-11を2w毎に2-3回投与し,その後3w休薬
05A0026	大腸XELOX	L-OHP:130mg/m ² day1 カベシタピン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで,カベシタピン2000mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。
05A0027	大腸アバスチン+XELOX	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 カベシタピン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A0027-2	大腸アバスチン+カベシタピン	Bev:7.5mg/kg day1 カベシタピン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A0028	大腸IRIS	CPT-11:100-125mg/m ² day1,15 S-1:80mg/m ² day1-14 4w毎
05A0030-1	大腸パニツムマブ単剤 (初回)	Pmab:6mg/kg day1 2w毎
05A0030-2	大腸パニツムマブ単剤 (2回目以降)	Pmab:6mg/kg day1 2w毎
05A0034	大腸パニツムマブ+CPT-11	Pmab:6mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0035	大腸アバスチン+CPT-11	Bev:5mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0036-1	大腸アバスチン+SOX	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎
05A0036-2	大腸アバスチン+SOX (L-OHP不耐)	Bev:7.5mg/kg day1 L-OHPは不耐のためOff S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎

05A0040-1	大腸セツキシマブ+FOLFIRI (初回) (へバフラッシュ)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-2	大腸セツキシマブ+FOLFIRI (2回目以降) (へバフラッシュ)	Cet:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-3	大腸セツキシマブ+FOLFIRI (へバフラッシュ)(500mg/m ²)(初回)	Cet:500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-4	大腸セツキシマブ+FOLFIRI (へバフラッシュ)(500mg/m ²)(2回目以降)	Cet:500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0041-1	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用 (初回) (へバフラッシュ)	Cet: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP1:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0041-2	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用 (2回目以降) (へバフラッシュ)	Cet: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP1:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0042	大腸パニツムマブ+FOLFOX (へバフラッシュ)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0043	大腸パニツムマブ+FOLFIRI (へバフラッシュ)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6外来用 (2回目以降) (へバフラッシュ)	Cet: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP1:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044-1	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6 (へバフラッシュ)(500mg/m ²)(初回)	Cet: 500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP1:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044-2	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6 (へバフラッシュ)(500mg/m ²)(2回目以降)	Cet: 500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP1:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0045	大腸アバスタチン+FOLFOXIRI入院用 (プロイメンド) (へバフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:165mg/m ² day1 5-FU: 3200mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A0046	大腸アバスタチン+FOLFOXIRI外来用 (イメンド) (へバフラッシュ)	Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:165mg/m ² day1 5-FU: day1 3200mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A0048	大腸ラムシルマブ+FOLFIRI (へバフラッシュ) (イメンド)	Ram:8mg/kg day1 レボ レチナト:200mg/m ² day1 イリリチン:180mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可

05A0049	大腸ラムシルマブ+FOLFIRI (ラムシルマブ単独)	Ram:8mg/kg day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
05A0051	大腸アバスタチン+IRIS	Bev:5mg/kg day1,15 CPT-11:100mg/m ² day1,15 TS-1:80mg/m ² day1夕~day15朝 4w毎
05A0059	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI 外来用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0060	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI 入院用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0061	大腸XELIRI+Bev	Bev:7.5mg/kg day1 CPT-11:200mg/m ² day1 カベシタピン:1600mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のCPT-11投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタピン1600mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。 ※UGT1A1の検査を行うこと
05A0063	大腸ベバシズマブ+TAS-102	Bev:5mg/kg day1,15 TAS-102:70mg/m ² /day (35mg/m ² /回 分2) day1-5、day8-12 4w毎
05A0064	大腸アバスタチン+mFOLFOX6入院用(未梢投与)【患者限定】	Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C0001	小腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C0002	小腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
14A0004	肛門管CDDP+5FU(75-1000) (CRT用) (プロイメンド)	CDDP:75mg/m ² day1 5-FU:1000mg/m ² day1-4 4w毎 4コースまで実施可能
14A0005	【医師限定】 肛門管5FU+MMC (無償提供) (CRT)	5-FU:1000mg/m ² day1-4 MMC:10mg/m ² day1 4w毎 4w1コースで、CRT中はday1とday29の計2コース投与する。
14A0006	【適外】 肛門管CBDCA+weeklyPTX (イメンド)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎