

レジメン番号	レジメン名	コメント
01A0001	肺VNR	VNR:25mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎
01A0002	肺ゲムシタピン	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎
01A0002AE	肺ゲムシタピン (副作用予防)	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎
01A0008	肺CBDCA+PTX (イメンド)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎
01A0008a	肺CBDCA+PTX (イメンド)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎
01A0012	肺GEM+VNR	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 VNR:25mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎
01A0012AE	肺GEM+VNR (副作用予防)	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 VNR:25mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎
01A0013	肺GEM+CBDCA(1)(イメンド)	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 CBDCA:AUC=6 day1 3w毎

01A0013AE	肺GEM+CBDCA(1)(副作用予防)(イメンド)	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 CBDCA:AUC=6 day1 3w毎
01A0016	肺CBDCA+ETOP(イメンド)	CBDCA:AUC=5 day1 ETP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
01A0019	肺PTX単剤	PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎
01A0020	肺CPT-11	CPT-11:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
01A0021	肺ハイカムチン	ノギテカン:1.0mg/m <sup>2</sup> day1-5 3w毎
01A0022	肺AMB 3days	AMR:40mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎
01A0025	肺CBDCA+CPT-11 (イメンド)	CBDCA:AUC=5 day1 CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
01A0025a	肺CBDCA+CPT-11 (イメンド)	CBDCA:AUC=5 day1 CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
01A0029	肺CBDCA+S-1(イメンド)	CBDCA:AUC=6 day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-14 3w毎 3コース以上、最大6コースまで

01A0032	肺PEM	<p>PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3-4w毎</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、</p> <p>PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p> <p>PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、</p> <p>その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与</p>
01A0034	肺CBDCA+PEM(イメンド)	<p>CBDCA:AUC=5(6) day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3-4w毎</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、</p> <p>PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与</p> <p>PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、</p> <p>その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与</p>
01A0035	肺CBDCA+weeklyPTX (イメンド)	<p>CBDCA:AUC=6 day1 PTX:70mg/m<sup>2</sup> day1,8,15 4w毎</p>
01A0035a	肺CBDCA+weeklyPTX (イメンド)	<p>CBDCA:AUC=6 day1 PTX:70mg/m<sup>2</sup> day1,8,15 4w毎</p>
01A0036	肺Bev	<p>Bev:15mg/kg day1 3w毎</p> <p>BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある</p>
01A0038	肺Bev+PEM	<p>Bev:15mg/kg day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3-4w毎</p> <p>BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与</p> <p>されることもある。入院時はBevとPEMが別日に投与されることもある。</p> <p>PEM初回投与の</p> <p>7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与。PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、</p> <p>その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与</p>
01A0038a	肺Bev+PEM	<p>Bev:15mg/kg day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3-4w毎</p> <p>BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与</p> <p>されることもある。入院時はBevとPEMが別日に投与されることもある。</p> <p>PEM初回投与の</p> <p>7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与。PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、</p> <p>その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与</p>
01A0039	肺Bev+CBDCA+PEM(イメンド)	<p>Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで</p> <p>投与されることもある。</p> <p>入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与。PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、</p>
01A0039a	肺Bev+CBDCA+PEM(イメンド)	<p>Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで</p> <p>投与されることもある。</p> <p>入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与。PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、</p>

01A0040	肺Bev+CBDCA+PTX (イメンド)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。
01A0040a	肺Bev+CBDCA+PTX (イメンド)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。
01A0041	肺CDDP+CPT-11 (イメンド)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1,8,(15) 3(4)w毎 CDDPは60mg/m <sup>2</sup> で投与することが多い
01A0042	肺CDDP+VNR (イメンド)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 VNR:25mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎 放射線同時併用時はVNR:20mg/m <sup>2</sup> に減量
01A0044	肺CDDP+ETOP (イメンド)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 ETP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
01A0044to	肺CDDP+ETOP (イメンド)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 ETOP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
01A0045-01	肺CDDP+TS-1 (イメンド)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 TS-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5w毎
01A0045b	肺CDDP+TS-1 (プロイメンド)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 TS-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5w毎
01A0046	肺CDDP+PEM (イメンド)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与, PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与, その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与

01A0046to	肺CDDP+PEM (イメンド)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A0050	肺ロゼウス (2W毎)	VNR:25mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎 投与前の白血球数が2000未満で延期し、2000以上に回復するのを待って投与する。
01A0051	肺Bev+PTX	Bev:15mg/kg day1 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある
01A0051a	肺Bev+PTX	Bev:15mg/kg day1 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある
01A0052	肺Bev+CBDCA+weeklyPTX (イメンド)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 day 1 PTX:70mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。
01A0052a	肺Bev+CBDCA+weeklyPTX (イメンド)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 day 1 PTX:70mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。
01A0059	肺GEM (2投1休)	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 3週毎
01A0059AE	肺GEM (2投1休) (副作用予防)	GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 3週毎
01A0064	肺Bev+CDDP+PEM(イメンド)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> BEV:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与

01A0064a	肺Bev+CDDP+PEM(イメンド)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> Bev:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A0064to	肺Bev+CDDP+PEM(プロイメンド)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 Bev:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A0077	肺レザフィリン	タラボルフィンナトリウム:40mg/m <sup>2</sup>
01A0078	肺weekly CBDCA+RT	CBDCA:AUC=2 1w毎 放射線治療期間中、化学療法施行
01A0079	肺Weekly (CBDCA+PTX) +RT	CBDCA:AUC=2 day1,8,15,22,29,36 PTX:40mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22,29,36 2Gy/日の放射線治療期間中、化学療法施行 その後通常のCBDCA:AUC=5 PTX:200mg/m <sup>2</sup> の3wに1回投与を2回追加
01A0079a	肺Weekly (CBDCA+PTX) +RT	CBDCA:AUC=2 day1,8,15,22,29,36 PTX:40mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22,29,36 2Gy/日の放射線治療期間中、化学療法施行 その後通常のCBDCA:AUC=5 PTX:200mg/m <sup>2</sup> の3wに1回投与を2回追加
01A0080	肺Nab PTX単剤	Nab PTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 3w毎
01A0081	肺CBDCA+Nab PTX(イメンド)	CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 3w毎
01A0081a	肺CBDCA+Nab PTX(イメンド)	CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 3w毎

01A0082	肺タルセバ+ Bev	エルロチニブ:150mg(Daily) Bev:15mg/kg day1 3w毎
01A0092	肺CDDP+PEM (イメンド) (short)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与
01A0092to	肺CDDP+PEM (イメンド) (short)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎(3コース毎)に1回投与
01A0093	肺CDDP+CPT-11 (イメンド) (short)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1,8,(15) 3(4)w毎 CDDPは60mg/m <sup>2</sup> で投与することが多い
01A0094	肺CDDP+VNR (イメンド) (short)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 VNR:25mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎 放射線同時併用時はVNR:20mg/m <sup>2</sup> に減量
01A0095AE	肺CDDP+GEM (イメンド) (short) (副作用予防)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 GEM:1000mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎
01A0096	肺CDDP+ETOP (イメンド) (short)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 ETP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3-4w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
01A0097	肺CDDP+TS-1 (イメンド) (short)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-14 3w毎
01A0097-01	肺CDDP+TS-1 (イメンド) (short)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 TS-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5w毎

01A0097a-1	肺CDDP+TS-1 (イメンド) (short)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 TS-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5w毎
01A0100	肺Bev+CDDP+PEM (イメンド) (short)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> BEV:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与
01A0100a	肺Bev+CDDP+PEM (イメンド) (short)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> BEV:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与
01A0100to	肺Bev+CDDP+PEM (イメンド) (short)	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 Bev:7.5mg/kg day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与
01A0104	肺DOC (*他科プロトコルあり)	DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎
01A0105	肺Bev+DOC	Bev:15mg/kg day1 DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある 入院時はBevとDOCが別日に投与されることもある
01A0105a	肺Bev+DOC	Bev:15mg/kg day1 DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある 入院時はBevとDOCが別日に投与されることもある
01A0109	肺CDDP+DOC (イメンド) (short)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 day1-3は経口補水液OS-1 1000ml/日を推奨
01A0114	肺ドセタキセル+ラムシルマブ	RAM:10mg/kg day1 DOC:60mg/m <sup>2</sup> day1 3W毎 入院時はRAMとDOCが別日に投与されることもある 投与基準:尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可



01A0115	肺ラムシルマブ単剤	RAM : 10mg/kg 3w毎 投与基準 : 尿蛋白+1以下の時は投与可
01A0116	肺ベムプロリズマブ	ベムプロリズマブ : 200mg/body day1 3w毎 *適応患者 : PDL1陽性のNSCLC (1st lineはPDL1発現≧50%)
01A0117	肺アテゾリズマブ	アテゾリズマブ : 1200mg/body day1 3w毎
01A0120	肺デュルバルマブ	デュルバルマブ : 10mg/kg 2w毎 ※投与期間は12ヶ月まで
01A0122	肺CDDP+ETOP+CPT-11(イメンド) (short)	CDDP:25mg/m <sup>2</sup> day1,8 ETOP:60mg/m <sup>2</sup> day1-3 CPT-11:90mg/m <sup>2</sup> day8 2w毎 5コース施行する 1コース目day9以降、連日G-CSF投与(抗癌剤投与日は除く) 但し、WBC≧10000で中断可
01A0123	肺ニボルマブ (240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
01A0124	肺(nonSq)アテゾリズマブ+Bev+CBDCA+PTX (イメンド)	アテゾリズマブ : 1200mg/body Bev:15mg/kg CBDCA:AUC=6 PTX:175mg/m <sup>2</sup> 各day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。 ※4~6コース施行後、maintenanceとしてアテゾリズマブ +Bev (maintenance) レジメンへ移行 ※非扁平上皮癌に対して使用する。
01A0124a	肺(nonSq)アテゾリズマブ+Bev+CBDCA+PTX (イメンド)	アテゾリズマブ : 1200mg/body Bev:15mg/kg CBDCA:AUC=6 PTX:175mg/m <sup>2</sup> 各day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。 ※4~6コース施行後、maintenanceとしてアテゾリズマブ +Bev (maintenance) レジメンへ移行 ※非扁平上皮癌に対して使用する。
01A0125	肺(nonSq)アテゾリズマブ+Bev (maintenance)	アテゾリズマブ : 1200mg/body Bev:15mg/kg day1 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある。 入院時はBevと他剤が別日に投与されることもある。 ※アテゾリズマブ +Bev+CBDCA+PTX4~6コース後のmaintenanceとしてのみ使用可能 ※非扁平上皮癌に対して使用する。

01A0126	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CBDCA+Nab PTX (イメンド)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/m<sup>2</sup> day1,8,15 3w毎</p> <p>※対象は扁平上皮癌のみ</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤レジメンへ移行</p> <p>※扁平上皮癌に対して使用する。</p>
01A0126a	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CBDCA+Nab PTX (イメンド)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/m<sup>2</sup> day1,8,15 3w毎</p> <p>※対象は扁平上皮癌のみ</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤レジメンへ移行</p> <p>※扁平上皮癌に対して使用する。</p>
01A0127	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CBDCA+PTX (イメンド)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤レジメンへ移行</p> <p>※対象は扁平上皮癌のみ</p>
01A0127a	肺(Sq)ベムプロリズマブ+CBDCA+PTX (イメンド)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ単剤レジメンへ移行</p> <p>※対象は扁平上皮癌のみ</p>
01A0128	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+CBDCA+PEM(イメンド)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、</p> <p>PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与</p> <p>葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用。</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ+PEMレジメンへ移行</p>
01A0129	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+PEM (maintenance)	<p>ベムプロリズマブ :200mg day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、</p> <p>PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与</p> <p>葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用</p> <p>※ベムプロリズマブ+CDDP/CBDCA+PEM4コース後のmaintenanceとしてのみ使用可能</p>
01A0130	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+CDDP+PEM (イメンド)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CDDP:75mg/m<sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、</p> <p>PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与</p> <p>葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ+PEMレジメンへ移行</p>
01A0131	肺(nonSq)ベムプロリズマブ+CDDP+PEM (イメンド) (short)	<p>ベムプロリズマブ :200mg/body day1 CDDP:75mg/m<sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、</p> <p>PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与</p> <p>葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用</p> <p>※4コース施行後は、maintenanceとしてベムプロリズマブ+PEMレジメンへ移行</p>
01A0132	肺CDGP+DOC	<p>CDGP:100mg/m<sup>2</sup> day1 DOC:60mg/m<sup>2</sup> day1 3w毎</p> <p>計4コース施行。担当医の判断で最大6コースまで</p>

01A0133	肺ゲフィチニブ+CBDCA+PEM (イメンド)	ゲフィチニブ:250mg(Daily) CBDCA:AUC5 day1 PEM:500mg/㎡ day1 3-4w毎 4-6コース PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与, PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与
01A0134	肺ゲフィチニブ+PEM	ゲフィチニブ:250mg(Daily) PEM:500mg/㎡ day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与, PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与
01A0136	肺Bev+S-1	Bev:15mg/kg day1 S-1:80mg/m2(換算表あり) day1-14 3w毎 BevはMAX15mg/kgで7.5mg/kgで投与されることもある
01A0137	肺アテゾリズマブ+CBDCA+ETOP(イメンド)	Atezolizumab:1200mg/body CBDCA:AUC=5 day1 ETOP:100mg/㎡ day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌 (進展型: ED) 患者のみ使用可 ※4コース施行後は、maintenanceとしてAtezolizumab単剤レジメンへ移行。
01A0138	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CBDCA+PEM(イメンド)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与, PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用。 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A0139	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CDDP+PEM (イメンド)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CDDP:75mg/㎡ day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A0140	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CDDP+PEM (イメンド) (short)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CDDP:75mg/㎡ day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ+PEMレジメンへ移行
01A0141	肺(nonSq)アテゾリズマブ+PEM (maintenance)	アテゾリズマブ:200mg day1 PEM:500mg/㎡ day1 3w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※アテゾリズマブ+CDDP/CBDCA+PEM4-6コース後のmaintenanceとしてのみ使用可能
01A0142	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CBDCA+Nab PTX (イメンド)	アテゾリズマブ:1200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 3w毎 ※対象は非扁平上皮非小細胞肺癌のみ ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ単剤レジメンへ移行

01A0142a	肺(nonSq)アテゾリズマブ+CBDCA+Nab PTX (イメンド)	アテゾリズマブ :1200mg/body day1 CBDCA:AUC=6 day1 Nab PTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 3w毎 ※対象は非扁平上皮非小細胞肺癌のみ ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてアテゾリズマブ単剤レジメンへ移行
01A0143	肺(Sq)ネシツムマブ+CDDP+GEM (イメンド) (short)	ネシツムマブ :800mg/body day1,8 CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 GEM:1250mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてネシツムマブ単剤レジメンへ移行
01A0144	肺(Sq)ネシツムマブ+CDDP+GEM (イメンド)	ネシツムマブ :800mg/body day1 CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 GEM:1250mg/m <sup>2</sup> day1,8 3w毎 ※4-6コース施行後は、maintenanceとしてネシツムマブ単剤レジメンへ移行
01A0145	肺(Sq)ネシツムマブ	ネシツムマブ :800mg/body day1,8 3w毎
01A0146	肺daily CBDCA+RT	CBDCA:30mg/m <sup>2</sup> 連日、計20回投与。 放射線治療第20回目まで。CBDCAは放射線治療1時間前に投与
01A0147	肺デュルバルマブ+CBDCA+ETOP(イメンド)	デュルバルマブ :1500mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 ETOP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※4コース施行後は、maintenanceとしてデュルバルマブ単剤レジメンへ移行 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする
01A0148	肺デュルバルマブ+CDDP+ETOP (イメンド) (short)	デュルバルマブ :1500mg/body day1 CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 ETP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※4コース施行後は、maintenanceとしてデュルバルマブ単剤レジメンへ移行 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする
01A0149	肺デュルバルマブ+CDDP+ETOP (プロイメンド)	デュルバルマブ :1500mg/body day1 CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 ETOP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎 ※小細胞肺癌(進展型:ED)患者のみ使用可 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする
01A0150	肺デュルバルマブ (4週毎)	デュルバルマブ :1500mg/body 4w毎 ※デュルバルマブ:体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする

01A0151	肺ベムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎 *適応患者:PDL1陽性のNSCLC (1st lineはPDL1発現≧1%)
01A0152	肺ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
01A0154	肺ニボルマブ(360mg/body)+イビリムマブ (1mg/kg)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎
01A0155	肺(Sq)=ニボルマブ+イビリムマブ+CBDCA+PTX (イメンド)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 CBDCA:AUC=6 day1,22 PTX:175mg/m <sup>2</sup> day1,22 6w毎 ※扁平上皮癌に使用する。 ※1コース実施後、maintenanceとしてイビリムマブ+ニボルマブレジメンへ移行
01A0156	肺(nonSq)=ニボルマブ+イビリムマブ+CDDP+PEM (アロイメント)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1,22 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎 PEM初回投与7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回の7日以上前にVB12を1回1mg筋注、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※1コース実施後、maintenanceとしてイビリムマブ+ニボルマブレジメンへ移行
01A0157	肺(nonSq)=ニボルマブ+イビリムマブ+CDDP+PEM (イメンド) (short)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1,22 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1,22 6w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与 PEM初回の7日以上前にVB12を1回1mg筋注、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※1コース実施後、maintenanceとしてイビリムマブ+ニボルマブレジメンへ移行
01A0158	肺(nonSq)=ニボルマブ+イビリムマブ+CBDCA+PEM(イメンド)	ニボルマブ:360mg/body day1,22 CBDCA:AUC=6 day1,22 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1,22 イビリムマブ:1mg/kg day1 6w毎 PEM初回投与7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM初回の7日以上前にVB12を1回1mg筋注、以後9週毎投与 葉酸とVB12はPEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 ※非扁平上皮癌に使用 ※1コース実施後、maintenanceとしてイビリムマブ+ニボルマブレジメンへ移行
01A0160	肺ゲフィチニブ+ラムシルマブ	RAM:10mg/kg 2w毎 ゲフィチニブ:250mg (Daily) 投与基準:尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
01B0001	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎 (3コース毎) に1回投与

01B0002	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM（イメンド）	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01B0003	悪性胸膜中皮腫CDDP+PEM（イメンド）（short）	CDDP:75mg/m <sup>2</sup> day1 PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01B0005	悪性胸膜中皮腫ニボルマブ（240mg/body）	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
01B0006	悪性胸膜中皮腫PEM	PEM:500mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎 PEM初回投与の7日以上前から葉酸1日1回0.5mg連日経口投与、 PEM最終投与日から22日目まで可能な限り投与 PEM初回投与の少なくとも7日前にVB12を1回1mg筋肉内投与、 その後、PEM投与期間中および投与中止後22日目まで9w毎（3コース毎）に1回投与
01B0008	【適外】悪性胸膜中皮腫ゲムシタピン	GEM:1250mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
01B0008AE	【適外】悪性胸膜中皮腫ゲムシタピン(副作用予防)	GEM:1250mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
01C0001	浸潤性胸腺腫・胸腺PAC療法	CDDP:50mg/m <sup>2</sup> day1 ADR:50mg/m <sup>2</sup> day1 CPA:500mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 最大8サイクルまで
01C0002	浸潤性胸腺腫・胸腺ADOC療法	CDDP:50mg/m <sup>2</sup> day1 ADR:40mg/m <sup>2</sup> day1 VCR:0.6mg/m <sup>2</sup> day3 CPA:700mg/m <sup>2</sup> day4 4w毎
01C0003	浸潤性胸腺腫・胸腺CBDCA+PTX（イメンド）	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎

01C0004	浸潤性胸腺腫・胸腺ADOC（イメンド）（short）	CDDP:50mg/m <sup>2</sup> day1 ADR:40mg/m <sup>2</sup> day1 VCR:0.6mg/m <sup>2</sup> day3 CPA:700mg/m <sup>2</sup> day4 4w毎
01C0005	【適外】浸潤性胸腺腫・胸腺CDDP+ETP+RT(short)（イメンド）	CDDP:50mg/m <sup>2</sup> day1,8、ETP:50mg/m <sup>2</sup> day1-5 4w毎 休薬基準：WBC<2000/mm <sup>3</sup> 、PLT<70000/mm <sup>3</sup> day8中止時は1週間後に次コースday1で開始 RT併用
21A0001	癌性胸膜炎hypotonic CDDP treatment（イメンド）	CDDP;25mg/body day1 3w毎