

レジメン番号	レジメン名	コメント
09C0002a	悪性リンパ腫BSリツキシマブ単独（初回50mL/h開始）	リツキシマブ:375mg/m ² day1 投与間隔、コース数については患者毎に異なる。
09C0004	悪性リンパ腫ABVD	ADR:25mg/m ² day1 BLM:9mg/m ² day1 VLB:6mg/m ² day1 DTIC:375mg/m ² day1 2w毎 2週間毎に投与し、4週間で1コースとする。 6-8コース行う。
09C0005	悪性リンパ腫CHASE	CPA:1200mg/m ² day1 Ara-C:2000mg/m ² day2-3 ETP:100mg/m ² day1-3 DEX:40mg/body day1-3 3w毎 最大5コースまで
09C0008	悪性リンパ腫Mini BEAM	MCNU:40mg/m ² day1 ETP:75mg/m ² day2-5 Ara-C:100mg/m ² /回 day2-5 1日2回 L-PAM:30mg/m ² day6 4w毎 ホジキンリンパ腫だけでなく非ホジキンリンパ腫のサルベージ療法として用いられる。
09C0011	悪性リンパ腫Devic療法	IFO:1.5g/m ² day1-3 ETP:100mg/m ² day1-3 CBDCA:300mg/m ² day1 DEX:40mg/body day1-3 3-4w毎
09C0012	悪性リンパ腫CHOP（点滴）	CPA:750mg/m ² day1 ADR:50mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 2-4w毎 投与間隔、投与コース数については患者毎に異なる。
09C0013a	悪性リンパ腫R-CHOP（点滴）（初回50mL/h開始）	リツキシマブ:375mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day2 ADR:50mg/m ² day2 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day2 PSL(点滴):100mg/回 day2 PSL(経口):100mg/回 day3-6 2-4w毎 リツキシマブ、CHOPはday1,day2固定ではなくCHOP先行やリツキシマブから CHOPまで数日空くこともある。
09C0013b	悪性リンパ腫CHOP-R（同日点滴）（初回50mL/h開始）	リツキシマブ:375mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 ADR:50mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 2-4w毎
09C0014	悪性リンパ腫THP-COP（点滴）	PSL:40mg/m ² -100mg/body day1-5 THP-ADM:40mg/m ² day1 VCR:1mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 CPA:650mg/m ² day1 3w毎

09C0018	悪性リンパ腫リツキササン+ゼヴァリン(111In)	リツキシマブ:250mg/m ² day1,7or8or9 day1の111In、day7-9(3日の内いずれかの1日)の90Y投与前にリツキシマブを投与する。
09C0018-1	悪性リンパ腫リツキササン+ゼヴァリン(90Y)	リツキシマブ:250mg/m ² day1,7or8or9 day1の111In、day7-9(3日の内いずれかの1日)の90Y投与前にリツキシマブを投与する。
09C0019	悪性リンパ腫SMILE療法	MTX:2g/m ² day1 IFO:1.5g/m ² day2,3,4 ETP:100mg/m ² day2,3,4 DEX:40mg/回 day2,3,4 L-アスパラギナーゼ:6000単位/m ² day8,10,12,14,16,18,20 4w毎
09C0021a	悪性リンパ腫R-CMD (初回50mL/h開始)	リツキシマブ:375mg/m ² day1 CPT-11:25mg/m ² day2-3 MIT:8mg/m ² day4 DEX:40mg/body day2-4 3w毎
09C0021b	悪性リンパ腫CMD-R (同日点滴) (初回50mL/h開始)	リツキシマブ:375mg/m ² day1 CPT-11:25mg/m ² day1-2 MIT:8mg/m ² day3 DEX:40mg/body day1-3 3w毎
09C0022	悪性リンパ腫ABVD (イメンド)	ADR:25mg/m ² day1 BLM:9mg/m ² day1 VLB:6mg/m ² day1 DTIC:375mg/m ² day1 2w毎 2週間毎に投与し、4週間で1コースとする。 6-8コース行う。
09C0023	悪性リンパ腫ICE	CBDC:AUC=5 day2 IFO:5g/m ² day2 ETP:100mg/m ² day1-3 2w毎
09C0024	悪性リンパ腫アドセトリス+AVD (イメンド)	ADR:25mg/m ² day1,15 VLB:6mg/m ² day1,15 DTIC:375mg/m ² day1,15 リツキシマブ ベドチン:1.2mg/kg day1,15 4w毎 (4wで1コース) ※最大6コースまで投与 ※G-CSF製剤併用すること
09C0025	悪性リンパ腫EPOCH	Lv1:ETP50,ADR10 day1-4 CPA750mg/m ² day5 Lv2:ETP60,ADR12 CPA900 Lv3:ETP72,ADR14.4 CPA1080 Lv4:ETP86.4,ADR17.3 CPA1296 Lv5: ETP103.7,ADR20.7 CPA1555.2 Lv6:ETP124.4,ADR24.8 CPA1866.2 all: VCR:0.4mg/m ² day1-4 PSL(p.o.):120mg/m ² (分2) day1-5 3w毎 ※ETP・ADR・CPAは好中球数及び血小板数により20%ずつ増減する。
09C0029	悪性リンパ腫Bendamustine	ベンダムスチン:120mg/m ² day1,2 3w毎 最大6コース

09C0030a	悪性リンパ腫R-bendamustine (初回50mL/h開始)	リツキシマブ : 375mg/m ² day1 ベンダムスチン : 90mg/m ² day2,3 4w毎 4-6コース ※1コース目の1w前と最終コースの4w後にリツキシマブを単独投与する
09C0030b	悪性リンパ腫bendamustine-R (同日点滴) (初回50mL/h開始)	リツキシマブ : 375mg/m ² day1 トレアキシソ : 90mg/m ² day1,2 4w毎 4-6コース ※1コース目の1w前と最終コースの4w後にリツキシマブを単独投与する
09C0031	悪性リンパ腫THP-COP(COP : CHOP量)	CPA:750mg/m ² day1 THP-ADR:50mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 2-4w毎 投与間隔、投与コース数については患者毎に異なる。
09C0032	悪性リンパ腫COP (点滴)	CPA:750mg/m ² day1、VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 2-4w毎
09C0033b	悪性リンパ腫COP-R (同日点滴) (初回50mL/h開始)	リツキシマブ:375mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 2-4w毎
09C0034	悪性リンパ腫CHOP-E	CPA:750mg/m ² day1 ADR:50mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 ETP:100mg/m ² day1-3 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 3w毎 投与間隔、投与コース数については患者毎に異なる。
09C0035	悪性リンパ腫COP-E	CPA:750mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (Max2.0mg/body) day1 ETP:100mg/m ² day1-3 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 3w毎
09C0036	悪性リンパ腫FC	FLU:25mg/m ² day1-3 CPA:250mg/m ² day1-3 4w毎 慢性リンパ性白血病にも用いることがある
09C0039	悪性リンパ腫アドセトリス	ブレンツキシマブ ベドチン:1.8mg/kg day1 3W毎
09C0042	悪性リンパ腫GCD	CBDCA:AUC=5 day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 DEX:40mg/body day1-4 3w毎 ※CD20陽性B細胞性悪性リンパ腫の時、 day8にRituximab375mg/m ² を併用する場合がある。 ※Neut500-1000/ μ L or PLT5万-10万の時、day8のGEMは25%減量 ※Neut \leq 500/ μ L or PLT \leq 5万以下の時、day8 GEMは中止

09C0042AE	悪性リンパ腫GCD（副作用予防）	CBDCA:AUC=5 day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 DEX:40mg/body day1-4 3w毎 ※CD20陽性B細胞性悪性リンパ腫の時、 day8にRituximab375mg/m ² を併用する場合がある。 ※Neut500-1000/ μ L or PLT5万-10万の時、day8のGEMは25%減量 ※Neut \leq 500/ μ L or PLT \leq 5万以下の時、day8 GEMは中止
09C0043AEa	悪性リンパ腫R-GCD（副作用予防）（初回50mL/h開始）	CBDCA:AUC=5 day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 DEX:40mg/body day1-4 3w毎 ※CD20陽性B細胞性悪性リンパ腫の時、 day8にRituximab375mg/m ² を併用する場合がある。 ※Neut500-1000/ μ L or PLT5万-10万の時、day8のGEMは25%減量 ※Neut \leq 500/ μ L or PLT \leq 5万以下の時、day8 GEMは中止
09C0044	悪性リンパ腫ジフォルタ	プララトレキサート:30mg/m ² day1 1w毎 ※週1回6週連続投与、7週目休薬 プララトレキサート初回投与の10日以上前から1日1回葉酸1mg連日経口投与、 プララトレキサート投与終了日から30日後までは葉酸投与継続。 プララトレキサート初回投与の10日以上前から、VB12を1回1mgを8~10週毎に筋肉内投与、 プララトレキサート投与中は、VB12継続。
09C0045a	マント細胞リンパ腫R-BAC（初回50mL/h開始）	リツキシマブ:375mg/m ² day1 ベンダムスチン:70mg/m ² day2,3 AraC:800mg/m ² day2,3,4 4w毎
09C0045b	マント細胞リンパ腫BAC-R（同日点滴）（初回50mL/h開始）	リツキシマブ:375mg/m ² day1 トレキシン:70mg/m ² day2,3 AraC:800mg/m ² day2,3,4 4w毎
09C0046	悪性リンパ腫ベムプロリズマブ	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎
09C0047	悪性リンパ腫イスタダックス	ロミデプシン:14mg/m ² day1,8,15 4w毎
09C0048	悪性リンパ腫G-bendamustine(1コース目)	ベムプロリズマブ:1000mg/body day1,8,15 ベンダムスチン:90mg/m ² day1,2 4w毎 ※1コース目のみベムプロリズマブは1週間毎に3回投与。 ※投与間隔、コース数については患者毎に異なる。 ※day1のベムプロリズマブとベンダムスチンの間は30分以上空ける。 ※day1,2のベンダムスチンの間は、12時間以上空ける。
09C0049	悪性リンパ腫G-bendamustine(2コース目以降)	ベムプロリズマブ:1000mg/body day1 ベンダムスチン:90mg/m ² day1,2 4w毎 ※投与間隔、コース数については患者毎に異なる。 ※day1のベムプロリズマブとベンダムスチンの間は30分以上空ける。 ※day1,2のベンダムスチンの間は、12時間以上空ける。
09C0050	悪性リンパ腫A-CHP（点滴）	CPA:750mg/m ² day1 ADR:50mg/m ² day1 BV:1.8mg/kg day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 3w毎 6-8コース

09C0050a	悪性リンパ腫A-CHP	CPA:750mg/m ² day1 ADR:50mg/m ² day1 プレンツキシマブ ベドチン:1.8mg/kg day1 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 3w毎 6-8コース
09C0065	悪性リンパ腫ニボルマブ (240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
09C0066	悪性リンパ腫CEPP療法(イメンド)	CPA:600mg/m ² day1,8 ETP:70mg/m ² day1,2,3 ※CPA:700mg/m ² ETP:100mg/m ² まで増量可 ブカルジン(p.o.):60mg/m ² day1-10 プレドニゾン(p.o.):60mg/m ² day1-10 4w毎 ※各コース毎で、好中球1500以上及び血小板150000以上あれば、CPA50mg/m ² 及ETP15mg/m ² ずつ増量可。 ※好中球1000-1499及び血小板50000-150000であれば、1週間延期の上、次コースは、CPA/ETOP 85%,PCZ 75%へ減量
09C0067-1	悪性リンパ腫mBonn protocol cycleA(1,4コース目)	MTX:3000mg/m ² day1, VCR : 2mg/body day2, IFO 0.8g/m ² day2-5 Dex 16.5mg/body day2-5。CD20陽性のときリツキシマブ併用可 day1にIT triple (MTX:15mg, AraC40mg, PSL 10mg) ※炭酸水素ナトリウム混注のメイン点滴は別途処方する 休薬期間21日、終了後cycleBへ
09C0067-1a	悪性リンパ腫mBonn protocol cycleA(1,4コース目)(イメンド)	MTX:3000mg/m ² day1 VCR:2mg/body day2 IFO:0.8g/m ² day2-5 Dex:16.5mg/body day2-5 CD20陽性のときリツキシマブ併用可 day1にIT triple (MTX:15mg/body AraC:40mg/body PSL:10mg/body) ※炭酸水素ナトリウム混注のメイン点滴は別途処方する 休薬期間21日終了後cycleBへ
09C0067-2	悪性リンパ腫mBonn protocol cycleB(2,5コース目)	MTX:3000mg/m ² day1, VCR : 2mg/body day2, CPA 200mg/m ² day2-5 Dex 16.5mg/body day2-5。CD20陽性のときリツキシマブ併用可 day1にIT triple (MTX:15mg, AraC40mg, PSL 10mg) ※炭酸水素ナトリウム混注のメイン点滴は別途処方する 休薬期間21日、終了後cycleCへ
09C0067-2a	悪性リンパ腫mBonn protocol cycleB(2,5コース目)(イメンド)	MTX:3000mg/m ² day1 VCR:2mg/body day2 CPA:200mg/m ² day2-5 Dex:16.5mg/body day2-5 CD20陽性のときリツキシマブ併用可 day1にIT triple (MTX:15mg/body AraC:40mg/body PSL:10mg/body) ※炭酸水素ナトリウム混注のメイン点滴は別途処方する 休薬期間21日終了後cycleCへ
09C0067-3	悪性リンパ腫mBonn protocol cycleC(3,6コース目)	Ara-C:2g/m ² /回 day1,2 12時間ごとに3時間で、VDS:5mg/body day1、Dexa 16.5mg day1-3 CD20陽性のときリツキシマブ併用可 day1にIT triple (MTX:15mg,AraC40mg,PSL10mg) 3コース目の後は、cycleAへ。6コース目で終了。 ステロイド点眼併用
09C0067-3a	悪性リンパ腫mBonn protocol cycleC(3,6コース目)	Ara-C:2g/m ² /回X2 day1,2 VDS:5mg/body day1 Dex:16.5mg/body day1-3 CD20陽性のときリツキシマブ併用可 day1にIT triple (MTX:15mg/body AraC:40mg/body PSL:10mg/body) 3コース目の後はcycleAへ。6コース目で終了。 ステロイド点眼併用
09C0068	悪性リンパ腫mESHAP (CBDCA)	mPSL:500mg/m ² day1-5 ETP:60mg/m ² day1-4 CBDCA:AUC=1.25 day1-4 (total AUC=5) (1日最大 200mg/body) Ara-C:2g/m ² day5 4w毎 最大6コース リツキシマブ併用可 64歳以上はETP:47.5mg/m ² Ara-C:1g/m ² に減量。

09C0069	悪性リンパ腫VR-CAP（初回50mL/h開始）	リツキシマブ:375mg/m ² day1 CPA:750mg/m ² day1 ADR:50mg/m ² day1 ボルテゾミブ:1.3mg/m ² day1,4,8,11 PSL(点滴):100mg/回 day1 PSL(経口):100mg/回 day2-5 3w毎 最大8コース
---------	--------------------------	---