

レジメンコード	レジメン名	コメント
05A0003	大腸FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速)day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0004	大腸FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速)day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0005	大腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0006	大腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0008	大腸アバステチン+FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	アバステチン:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0009	大腸アバステチン+FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	アバステチン:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0010	大腸アバステチン+mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	アバステチン:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0011	大腸アバステチン+mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	アバステチン:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0020-1	大腸セツキシマブ単剤(初回)	セツキシマブ:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎
05A0020-2	大腸セツキシマブ単剤(2回目以降)	セツキシマブ:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 1w毎
05A0020-3	大腸セツキシマブ単剤(500mg/m ²)(初回)	セツキシマブ:500mg/m ² day1 2w毎
05A0020-4	大腸セツキシマブ単剤(500mg/m ²)(2回目以降)	セツキシマブ:500mg/m ² day1 2w毎
05A0024-1	大腸セツキシマブ+CPT-11(隔週)(初回)	セツキシマブ: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-2	大腸セツキシマブ+CPT-11(隔週)(2回目以降)	セツキシマブ: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1,8 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-3	大腸セツキシマブ+CPT-11(500mg/m ²)(初回)	セツキシマブ: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0024-4	大腸セツキシマブ+CPT-11(500mg/m ²)(2回目以降)	セツキシマブ: 500mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0025	大腸CPT-11単剤(隔週)	CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎 通常のCPT-11を2w毎に2-3回投与し、その後3w休薬
05A0026	大腸XELOX(APR)	L-OHP:130mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで、Cape:2000mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。
05A0027	大腸アバステチン+XELOX(APR)	アバステチン:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 Cape:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A0027-2	大腸アバステチン+カペシタビン	アバステチン:7.5mg/kg day1 カペシタビン:2000mg/m ² /day day1-14 3w毎
05A0028	大腸IRIS	CPT-11:100-125mg/m ² day1,15 S-1:80mg/m ² day1-14 4w毎
05A0030-1	大腸パニツムマブ単剤(初回)	パニツムマブ:6mg/kg day1 2w毎
05A0030-2	大腸パニツムマブ単剤(2回目以降)	パニツムマブ:6mg/kg day1 2w毎
05A0034	大腸パニツムマブ+CPT-11	パニツムマブ:6mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎

05A0035	大腸アバステチン+CPT-11	アバステチン:5mg/kg day1 CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎
05A0036-1	大腸アバステチン+SOX(APR)	アバステチン:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/m ² day1 S-1:80-120mg/day 1日2回 day1タ-day15朝 3w毎
05A0036-2	大腸アバステチン+SOX(L-OHP不耐)	アバステチン:7.5mg/kg day1 L-OHPは不耐のためOff S-1:80-120mg/day 1日2回 day1タ-day15朝 3w毎
05A0040-1	大腸セツキシマブ+FOLFIRI(初回)(ヘパフラッシュ)	セツキシマブ:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1.8 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-2	大腸セツキシマブ+FOLFIRI(2回目以降)(ヘパフラッシュ)	セツキシマブ:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1.8 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-3	大腸セツキシマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/m ²)(初回)	セツキシマブ:500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0040-4	大腸セツキシマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/m ²)(2回目以降)	セツキシマブ:500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0041-1	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用(初回)(ヘパフラッシュ)	セツキシマブ: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1.8 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:1.85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0041-2	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用(2回目以降)(ヘパフラッシュ)	セツキシマブ: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1.8 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:1.85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0042	大腸パニツムマブ+FOLFOX(ヘパフラッシュ)	パニツムマブ:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0043	大腸パニツムマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)	パニツムマブ:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:150mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6外来用(2回目以降)(ヘパフラッシュ)	セツキシマブ: 250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1.8 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:1.85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044-1	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6(ヘパフラッシュ)(500mg/m ²)(初回)	セツキシマブ: 500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:1.85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044-2	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6(ヘパフラッシュ)(500mg/m ²)(2回目以降)	セツキシマブ: 500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:1.85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0044-4	大腸セツキシマブ+mFOLFOX6入院用(500mg/m ²)(初回)(末梢投与)	セツキシマブ:500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0045	大腸アバステチン+FOLFOXIRI入院用(プロイメンド)(ヘパフラッシュ)	アバステチン:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:165mg/m ² day1 5FU: 3200mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A0046	大腸アバステチン+FOLFOXIRI外来用(APR)(ヘパフラッシュ)	アバステチン:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:165mg/m ² day1 5FU: day1 3200mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応
05A0048	大腸ラムシルマブ+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(APR)	ラムシルマブ:8mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
05A0049	大腸ラムシルマブ+FOLFIRI(ラムシルマブ単独)	ラムシルマブ:8mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
05A0051	大腸アバステチン+IRIS	アバステチン:5mg/kg day1.15 CPT-11:100mg/m ² day1.15 TS-1:80mg/m ² day1タ~day15朝 4w毎
05A0052	大腸mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0059	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0060	大腸アフリベルセプト+FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ)	アフリベルセプト:4mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 CPT-11:180mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0061	大腸XELIRI+Bev	Bev:7.5mg/kg day1 CPT-11:200mg/m ² day1 Cape:1600mg/m ² /day day1-14 3w毎 day1のCPT-11投与終了後の日からday15の朝まで、Cape1600mg/m ² /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。 ※UGT1A1の検査を行うこと

05A0063	大腸ペバシズマブ+TAS-102	ペバシズマブ:5mg/kg day1,15 TAS-102:70mg/m ² /day(35mg/m ² /回 分2) day1-5、day8-12 4w毎
05A0064	大腸アバステチン+mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】	アバステチン:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0065-1	大腸エンコラフェニブ+ピニメチニブ+セツキシマブ(初回)	セツキシマブ:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 エンコラフェニブ 300mg 1日1回 day1-7 ピニメチニブ 45mg/回 1日2回 day1-7 1w毎
05A0065-2	大腸エンコラフェニブ+ピニメチニブ+セツキシマブ(2回目～)	セツキシマブ:250mg/m ² (初回は400mg/m ²) day1 エンコラフェニブ 300mg 1日1回 day1-7 ピニメチニブ 45mg/回 1日2回 day1-7
05A0066	大腸Bmab+5-FU/I-LV外来用(ヘパフラッシュ)(維持療法)	Bmab:5mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0067	大腸Pmab+5-FU/I-LV 外来用(ヘパフラッシュ)(維持療法)	Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05A0068	大腸Cmab+5-FU/I-LV (ヘパフラ)(500mg/m ²)(2回目以降)(維持療法)	Cmab: 500mg/m ² day1 I-LV:200mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C0001	小腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C0002	小腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
05C0003	小腸mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】	I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎
14A0003	肛門管CDDP+5FU(80-800)(プロイメント)	CDDP:80mg/m ² day1 5FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎
14A0004	肛門管CDDP+5FU(75-1000)(CRT用)(プロイメント)	CDDP:75mg/m ² day1 5FU:1000mg/m ² day1-4 4w毎 4コースまで実施可能
14A0005	【医師限定】肛門管5FU+MMC(無償提供)(CRT)	5FU:1000mg/m ² day1-4 MMC:10mg/m ² day1 4w毎 4w1コースで、CRT中はday1とday29の計2コース投与する。
14A0006	【適外】肛門管CBDCA+weeklyPTX(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎