

レジメンコード	レジメン名	コメント
10C0006	悪性黒色腫イピリムマブ	イピリムマブ:3mg/kg day1 3w毎 4回まで ※処方医はE-learningが必要
10C0008	悪性黒色腫IFN300(維持療法)	IFN-β :300万単位/body day1 ※術後療法投与終了日から最低3週間は空ける
10C0009	悪性黒色腫IFN300(術後療法)	IFN-β :300万単位/body day1 ※5~10日間連続投与する。最終投与日から3週間隔で3~5コース行う。
10C0011	悪性黒色腫ダカルバジン療法(1日投与、APR)	ダカルバジン:1000mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 ルートも含め、遮光で投与すること。 また、刺入部を温庵
10C0012	悪性黒色腫CBDCA+PTX (APR)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎
10C0015	悪性黒色腫ニボルマブ(80mg/body)+イピリムマブ(3mg/kg)	ニボルマブ:80mg/body day1 イピリムマブ:3mg/kg day1 3w毎 ※併用4コース終了3週後から、ニボルマブ単独(240mg/body)(2w毎)投与を繰り返す
10C0016	悪性黒色腫ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
10C0017	悪性黒色腫ペムブロリズマブ(200mg/body)	ペムブロリズマブ:200mg/body day1 3w毎
10C0018	悪性黒色腫ペムブロリズマブ(200mg/body)(術後補助療法)	ペムブロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10C0019	悪性黒色腫ニボルマブ(240mg/body)(術後補助療法)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10C0020	悪性黒色腫ペムブロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ペムブロリズマブ:400mg/body day1 6w毎
10C0021	悪性黒色腫ペムブロリズマブ(6週毎)(400mg/body)(術後補助療法)	ペムブロリズマブ:400mg/body day1 6w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10C0022	悪性黒色腫ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
10C0023	悪性黒色腫ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)(術後補助療法)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10G0001	皮膚腺癌Weeklyドセタキセル	ドセタキセル:25mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
10G0003	皮膚腺癌Weeklyバクリタキセル	バクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> day1 1w毎
10G0004	皮膚腺癌Low dose FP (APR)	CDDP:10mg/body day1-5 5FU:600mg/m <sup>2</sup> day1-5 4w毎
10I0001	メルケル細胞癌アベルマブ	アベルマブ:10mg/kg 2w毎 ※適応:根治切除不能なメルケル細胞癌
10I0002	【適外】メルケル細胞癌CDDP+ETOP (APR)	CDDP:25mg/m <sup>2</sup> day1-3, ETOP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎 標準量開始基準:Neut ≥ 1500, PLT ≥ 10万, CCr ≥ 60 CCr 45-59はシスプラチンを80%に減量 放射線療法を同時併用することもある
10I0003	【適外】メルケル細胞癌CBDCA+ETOP (APR)	CBDCA:AUC=5 day1 ETOP:100mg/m <sup>2</sup> day1-3 3w毎 標準量開始基準:Neut ≥ 1500, PLT ≥ 10万 放射線療法を同時併用することもある
10J0001	有棘細胞癌CPT-11	CPT-11:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15,22 6w毎 WBC 3000以上、PLT 10万以上
10J0002	有棘細胞癌WeeklyCDDP+RT (プロイメンド)	CDDP 40mg/m <sup>2</sup> day1 1w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回
10J0003	有棘細胞癌CDDP+ADR (プロイメンド)	CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 ADR 50mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 ※ADRの総投与量が500mg/m <sup>2</sup> を超えない

10J0004	【適外】有棘細胞癌CDDP+5FU(80-800)(プロイメンド)	CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5 4w毎
10K0001	基底細胞癌CDDP+ADR(プロイメンド)	CDDP 75mg/m <sup>2</sup> day1 ADR 50mg/m <sup>2</sup> day1 3w毎 ※ADRの総投与量が500mg/m <sup>2</sup> を超えない