

レジメンコード	レジメン名	コメント
10A0001-1	肉腫ADR+CDDP(末梢)(APR)	ADR:45mg/m ² day1-2 CDDP:60mg/m ² day1-2
10A0001-2	肉腫ADR+CDDP(中心)(APR)	ADR:45mg/m ² day1-2 CDDP:60mg/m ² day1-2
10A0002-1	肉腫HD-IFO(末梢)(APR)	IFO:4g/body(IFO:12-16g/m ² ,Max4g/body/day) day1-6 総量20-24g/bodyを標準としている。 投与量が20g/bodyまでの場合、5日間で投与を完了することがある。
10A0002-2	肉腫HD-IFO(中心)(APR)	IFO:4g/body(IFO:12-16g/m ² ,Max4g/body/day) day1-6 総量20-24g/bodyを標準としている。 投与量が20g/bodyまでの場合、5日間で投与を完了することがある。
10A0003-2	肉腫MTX(中心)(APR)	MTX:10-12g/m ² day1,8 MTXは250-300mg/kgで計算も可
10A0004-1	肉腫ADR+IFO(末梢)(APR)	ADR:30mg/m ² day1-2 IFO:2g/m ² (Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可(例:40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A0004-2	肉腫ADR+IFO(中心)(APR)	ADR:30mg/m ² day1-2 IFO:2g/m ² (Max4g/body/day) day1-5 ADR 1mg未満切り捨て IFO 0.1g未満切り捨て 年齢、腎機能などにより50%まで減量可(例:40歳以上で80%、65歳以上で60%)
10A0006-1	肉腫VAdrC(末梢)(APR)	CPA:1000-1200mg/m ² day1 ADR:30-37.5mg/m ² day1-2 VCR:1.5mg/m ² day1 VCRはMax2mg/body
10A0006-2	肉腫VAdrC(中心)(APR)	CPA:1000-1200mg/m ² day1 ADR:30-37.5mg/m ² day1-2 VCR:1.5mg/m ² day1 VCRはMax2mg/body
10A0007-1	肉腫IE(末梢)(APR)	IFO:2-3g/m ² (IFO:6-9g/m ² ,Max4g/body/day) day1-3(+day4) ETP:100mg/m ² day1-3
10A0007-2	肉腫IE(中心)(APR)	IFO:2-3g/m ² (IFO:6-9g/m ² ,Max4g/body/day) day1-3(+day4) ETP:100mg/m ² day1-3
10A0008-1	肉腫ICE(末梢)(APR)	CBDCA:300mg/m ² day3 IFO:3g/body day1-3 ETP:100mg/m ² day1-3
10A0008-2	肉腫ICE(中心)(APR)	CBDCA:300mg/m ² day3 IFO:3g/body day1-3 ETP:100mg/m ² day1-3
10A0015	肉腫VLB+MTX【患者限定】	VLB:6mg/m ² day1 MTX:30mg/m ² day1 3-4w毎
10A0018	肉腫アドリアマイシン単剤(60mg/m ²)(APR)	アドリアマイシン:60mg/m ² day1 3W毎
10A0019	肉腫トラベクテジン	トラベクテジン:1.2mg/m ² day1 3w毎 <投与開始基準>好中球1500/mm ³ 以上、Hb9.0g/dL以上、 血小板10万/mm ³ 以上、アルブミン2.5g/dL以上

10A0023	肉腫エリブリン	エリブリン:1.4mg/m ² day1,8 3w毎
10A0024	肉腫アドリアマイシン単剤(75mg/m ²)(末梢)(APR)	アドリアマイシン:75mg/m ² day1 3w毎
10A0025	肉腫アドリアマイシン単剤(75mg/m ²)(中枢)(APR)	アドリアマイシン:75mg/m ² day1 3w毎
10A0026	肉腫VAdrC(中心)(APR)(ユーイング肉腫)	CPA:1200mg/m ² day1 ADR:37.5mg/m ² day1-2 VCR:1.5mg/m ² (Max:2.0mg/body) day1 ※ADR累積量:375mg/m ² ※6.7サイクルはADR抜きで実施。 ※2週毎に肉腫VAdrC(中心)(APR)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)(APR)レジメンを繰り返し、14サイクル行う。
10A0027	肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)(APR)	IFO:1.8g/m ² day1-5 ETP:100mg/m ² day1-5 ※2週毎に肉腫VAdrC(中心)(APR)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(中心)(ユーイング肉腫)(APR)レジメン繰り返し、14サイクル行う。
10A0028	肉腫IE(末梢)(ユーイング肉腫)(APR)	IFO:1.8g/m ² day1-5 ETP:100mg/m ² day1-5 ※2週毎に肉腫VAdrC(中心)(APR)(ユーイング肉腫)レジメン →肉腫IE(ユーイング肉腫)(APR)レジメン繰り返し、14サイクル行う。
10A0029	肉腫CPT-11+TMZ(ユーイング肉腫)	CPT-11:20mg/m ² day1-5 day8-12 TMZ:100mg/m ² /日 経口 day1-5 3w毎 TMZは朝食2時間半後に服用 CPT-11はTMZ内服後1時間以上あけて投与
10A0030	【適外】肉腫ノギテカン+CPA(ユーイング肉腫)	ノギテカン:0.75mg/m ² day1-5 CPA:250mg/m ² day1-5 3w毎
10A0031	【適外】肉腫VNR+PAZ【患者限定】	VNR:25mg/m ² day1,8,15 4w毎 PAZ:800mg/day 連日
10F0001	血管肉腫パクリタキセル	パクリタキセル:100mg/m ² day1,8,15,22,29,36 8w毎
10F0002	【適外】血管肉腫weeklyドセタキセル	ドセタキセル:25mg/m ² day1,8,15 4w毎
10F0003	【適外】肉腫VAC(APR)	VCR:1.5mg/m ² (max 2mg/body) day1,8,15 CPA:1200mg/m ² day1, ACT-D:0.045mg/kg(max 2.3mg/body) day1 放射線療法中はACT-Dは投与しない