

レジメンコード	レジメン名	コメント
07A0001	卵巣TC(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07A0006	卵巣・腹膜dose dense TC(APR)	PTX:80mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC=6 day1 3w毎 6-9コース繰り返す
07A0007	卵巣PLD	PLD:50mg/m ² day1 4w毎
07A0009	卵巣CPT-11	CPT-11:100mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A0011	卵巣ノギテカン単剤	ノギテカン:1.5mg/m ² day1-5 3w毎
07A0012	卵巣GEM単剤	GEM:1000mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A0012AE	卵巣GEM単剤(副作用予防)	GEM:1000mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A0013	卵巣TN	PTX:175mg/m ² day1 CDGP:100mg/m ² day1 4w毎
07A0014	卵巣胚細胞腫瘍BEP(APR)	CDDP:20mg/m ² day1-5 ETP:100mg/m ² day1-5 BLM:30mg/body day2,9,16 3w毎 BLMの総投与量は300mgを超えないこととする
07A0016	卵巣Bev+TC(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body ※手術後28日以内に1コース目を開始する場合にはBev抜き(卵巣TC(イメンド))で行う
07A0017	卵巣Bev	Bev:15mg/kg day1 3w毎
07A0018	卵巣Bev+PLD	Bev:15mg/kg day1 PLD:40mg/m ² day1 4w毎 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること
07A0020	卵巣Bev+PTX	Bev:15mg/kg day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎
07A0021	卵巣Bev+ノギテカン	Bev:15mg/kg day1 ノギテカン:1.25mg/m ² day1-5 3w毎
07A0023	卵巣Bev+GC(外来用)	Bev:15mg/kg day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎
07A0023AE	卵巣Bev+GC(外来用)(副作用予防)	Bev:15mg/kg day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎
07A0026	卵巣DC	DOC:70mg/m ² day1 CBDCA:AUC=5 day1 3-4w毎 合計6回
07A0027	卵巣PLD+CBDCA(APR)	PLD:30mg/m ² day1 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること CBDCA:AUC=5 day1 4w毎
07A0028	卵巣weekly low dose TC	PTX:60mg/m ² day1 CBDCA:AUC=2 day1 1w毎

07A0029	卵巣Bev+オラパリブ	Bev:15mg/kg day1 3w毎 オラパリブ600mg/day 連日内服 ※相同組換え修復欠損を有する卵巣癌
07A0030	卵巣Bev+PLD+CBDCA (APR)	CBDCA:AUC=5 day1 Bev:10mg/kg day1,15 PLD:30mg/m ² day1 4w毎 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること 6コース実施後、維持療法としてBev単剤(15mg/kg 3w毎)に移行する