

レジメンコード	レジメン名	コメント
03A0004	胃weekly パクリタキセル	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎
03A0008	胃CPT-11(60)+CDDP(30)	CPT-11:60mg/m <sup>2</sup> day1 CDDP:30mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎
03A0009	胃CPT-11単剤	CPT-11:150mg/m <sup>2</sup> day1 2w毎
03A0011	胃TS-1+CDDP(プロイメンド)	CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day8 TS-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-21 4-5週毎
03A0014-3	胃XP+Tra(プロイメンド)(XP投与不能時)	Tra:2回目を以降6mg/kg day1 3w毎
03A0014-4	胃XP+Tra(プロイメンド)(7コース目を以降、CDDP抜き)	Cape:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 Tra:2回目を以降6mg/kg day1 3w毎 7コース目を以降はCDDPを抜くことがある。
03A0016-1	胃FP+Tra(プロイメンド)初回	5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5(持続静注) CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 Tra:初回8mg/kg 2回目を以降6mg/kg day1 3w毎
03A0016-2	胃FP+Tra(プロイメンド)2回目を以降	5FU:800mg/m <sup>2</sup> day1-5(持続静注) CDDP:80mg/m <sup>2</sup> day1 Tra:初回8mg/kg 2回目を以降6mg/kg day1 3w毎
03A0019-3	胃SP+Tra(プロイメンド)(SP投与不能時、Tra6mg/kg)	S-1:80mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 Tra:2回目を以降6mg/kg day1 3w毎
03A0019-4	胃SP+Tra(プロイメンド)(SP投与不能時、Tra8mg/kg)	S-1:80mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 CDDP:60mg/m <sup>2</sup> day1 Tra:初回8mg/kg day1 3w毎
03A0020	胃XELOX(APR)	L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 Cape:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで、Cape2000mg/m <sup>2</sup> /dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。
03A0021	胃SOX(APR)	L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 S-1:40-60mg/回day1夕-day15朝 3w毎
03A0024-1	胃XELOX+Tra(初回)(APR)	Tra:8mg/kg day1 L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 Cape:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 3w毎
03A0024-2	胃XELOX+Tra(2回目を以降)(APR)	Tra:6mg/kg day1 L-OHP:130mg/m <sup>2</sup> day1 Cape:2000mg/m <sup>2</sup> /day day1-14 3w毎
03A0025-1	胃パクリタキセル+ラムシルマブ	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ:8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準:尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
03A0025-2	胃パクリタキセル+ラムシルマブ(PTX単剤投与時)	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ:8mg/kg day1,15 4w毎
03A0025-3	胃パクリタキセル+ラムシルマブ(ラムシルマブ単剤投与時)	パクリタキセル:80mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 ラムシルマブ:8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準:尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
03A0026	胃ラムシルマブ単剤	ラムシルマブ:8mg/kg 2w毎 投与基準:尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/Scr比が2g未満で投与可
03A0027	胃S-1+DOCE	S-1:80mg/m <sup>2</sup> day1-14 DOCE:40mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎
03A0028	胃ドセタキセル	ドセタキセル:60mg/m <sup>2</sup> day1 3-4w毎
03A0029	胃mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP:85mg/m <sup>2</sup> day1 5FU:400mg/m <sup>2</sup> (急速) day1 2400mg/m <sup>2</sup> (持続) day1-2 2w毎
03A0030	胃mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ)	I-LV:200mg/m <sup>2</sup> day1 L-OHP:85mg/m <sup>2</sup> day1 5FU:400mg/m <sup>2</sup> (急速) day1 2400mg/m <sup>2</sup> (持続) day1-2 2w毎
03A0031	胃Nab PTX単剤	Nab PTX:100mg/m <sup>2</sup> day1,8,15 4w毎

03A0033-1	胃Nab PTX+ラムシルマブ(アルコール不耐)	Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 ラムシルマブ:8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準:尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ投与可
03A0033-2	胃Nab PTX+ラムシルマブ(nabPTX単剤投与時)(アルコール不耐)	Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 ラムシルマブ:8mg/kg day1,15 4w毎 投与基準:尿蛋白+1以下の時はラムシルマブ投与可
03A0033-3	胃Nab PTX+ラムシルマブ(ラムシルマブ単剤投与時)(アルコール不耐)	Nab PTX:100mg/㎡ day1,8,15 ラムシルマブ:8mg/kg day1,15 4W毎 投与基準:尿蛋白+1以下の時は投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可
03A0036	胃SOX+Tra(初回)(APR)	Tra:8mg/kg day1 L-OHP:130mg/㎡ day1 S-1:80mg/㎡ day1-14 3w毎
03A0037	胃SOX+Tra(2回目以降)(APR)	Tra:6mg/kg day1 L-OHP:130mg/㎡ day1 S-1:80mg/㎡ day1-14 3w毎 ※Traは、予定日を1週間超えた際は初回投与量及び初回投与時間に戻す
03A0038	胃mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】	I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎
03A0039	胃ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
03A0040	胃トラスツズマブ デルクステカン	トラスツズマブ デルクステカン:6.4mg/kg day1 3w毎 初回90分で、2回目以降忍容性が認めれば30分で投与可 HER2陽性胃癌に適應
03A0041	胃ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
03A0042	胃ニボルマブ+XELOX(APR)	ニボルマブ:360mg/body day1 L-OHP:130mg/㎡ day1 Cape:2000mg/㎡/day day1夕-15朝 3w毎
03A0043	胃ニボルマブ+XELOX(L-OHP不耐)	ニボルマブ:360mg/body day1 Cape:2000mg/㎡/day day1夕-15朝 3w毎
03A0044	胃ニボルマブ+SOX(APR)	ニボルマブ:360mg/body day1 L-OHP:130mg/㎡ day1 S-1:80mg/㎡/day day1夕-15朝 3w毎
03A0045	胃ニボルマブ+SOX(L-OHP不耐)	ニボルマブ:360mg/body day1 S-1:80mg/㎡/day day1夕-15朝 3w毎