






カルボプラチン＋エトポシド療法を受けられる患者さまへ



	1日目	2日目	3日目
	アプレピタントカプセル 125mg (カルボプラチン 1～1.5 時間前)	アプレピタントカプセル 80mg (朝食後)	アプレピタントカプセル 80mg (朝食後)
	生理食塩液 50mL	生理食塩液 50mL	生理食塩液 50mL
	グラニセトロンバッグ ＋デキサート 約 10 分	生理食塩液 50mL ＋デキサート 約 10 分	生理食塩液 50mL ＋デキサート 約 10 分
	生理食塩液 500mL <u>エトポシド</u> 約 60 分	生理食塩液 500mL <u>エトポシド</u> 約 60 分	生理食塩液 500mL <u>エトポシド</u> 約 60 分
	生理食塩液 250mL ＋ <u>カルボプラチン</u> 約 30 分		

点滴部位の痛みや腫れ、点滴が落ちにくいなどがあれば、すぐにナースコールして下さい。

点滴の時間は、おおよその時間です。多少前後する事があります。また、治療の経過により、点滴が変更・追加になることがあります。



おもな副作用

★★骨髄抑制（白血球・ヘモグロビン・血小板の減少）★★

血液中の細胞成分は白血球・赤血球・血小板の3種類で、骨髄で造られ、化学療法の副作用により骨髄の機能が低下し減少します。

白血球・血小板は、7－14日で最も減少します。

	対 応
白血球 (好中球: NEUT)	白血球(好中球)は、細菌から体を守る働きをしていますので、白血球が低くなると体の抵抗力が弱くなり、感染症を起こしやすくなります。 マスクをしたり、手洗いやうがいをして感染を予防しましょう。
ヘモグロビン (Hb)	赤血球の中のヘモグロビンは酸素を体中に運ぶ役割をしており減少すると、貧血の症状（動悸・めまい・息切れ・頭痛・倦怠感・立ちくらみなど）が現れます。ヘモグロビンが かなり下がると赤血球輸血をすることがあります。
血小板 (PL)	血小板は、血を止める働きがあります。血小板が5万より減少すると、出血しやすくなります。(血が止まりにくい・鼻血が出やすい・青あざがしやすい。)血小板がかなり下がると血小板輸血をすることがあります。

★★吐き気（悪心）・嘔吐、食欲不振★★

消化管（口、胃、腸）の粘膜や、脳の中樞を刺激することによって起こります。数時間後に始まることが多いようですが、人によって数日間続く場合もあります。つらいときは我慢せず、早めに言いましょう。

★★口内炎★★

口の中・歯肉・咽喉がしみる、ひりひりする、赤くなるといった症状が出る場合があります。口の中を清潔に保つよう心がけましょう。

★★間質性肺炎★★

空咳・息苦しさ・息切れ・発熱等の風邪のような症状がでた時は、すぐに医療スタッフに伝え下さい。

★★アレルギー反応★★

薬に対する過敏反応が起きることがあります。点滴中に、息苦しい、胸が痛い、心臓がドキドキする、顔がほてる、汗が出る、発疹が出る、などの症状があったら、すぐに連絡しましょう。

★★下痢、便秘★★

下痢や便秘になることがあります。

★腎障害★

膀胱や腎臓に影響をあたえる場合があります。排尿時の痛み、トイレが近くなる、血尿が出る、尿意が突然現れる、尿が少ない、熱や寒気がするなどの症状が出たときは伝えて下さい。

★聴力（聴覚）障害★

聞こえにくかったり、耳鳴りがおこったらすぐに言って下さい。

★手足のしびれ（末梢神経障害）★

治療後3～5日後から、手や足がしびれたり、刺すような痛みがあったり、手の指や足の裏の感覚が変わってきたり、鈍くなったりすることがあります。気になるときは我慢せず伝えて下さい。

★疲労感・倦怠感（だるさ）★

★脱毛★

薬によって、髪が抜けるものと抜けないものがあります。また、髪の抜け方に個人差があります。治療後2～3週間あたりから毛が抜け始め、髪以外の部分（体毛・眉毛・陰毛）でもおこります。治療が終了して6～8週間には毛が生え始め約半年でほぼ回復します。

★発疹★

皮膚が赤くなったり、かゆみを伴うこともあります。放置せずに早めに伝えてください。

上記のような副作用が主に挙げられますが、必ずこれらの副作用が起こるわけではなく、人によって差があります。

副作用をおさえる薬もありますので、気になることがあれば何でも伝えてください。

