肺デュルバルマブ療法を受けられる

患者さまへ

治療スケジュール

	１日目
イミフィンジ®注（デュルバルマブ）	●

※２週ごとに繰り返します。

点滴の流れ

	生理食塩液　50mL	血管の確認をします。
	生理食塩液　２５０mL イミフィンジ®注	６０分
	生理食塩液　50mL	

点滴部位の痛みや腫れ、点滴が落ちにくいなどがあれば、すぐにナースコールして下さい。
点滴の時間は、おおよその時間です。
多少前後する事があります。

大阪国際がんセンター　　薬局

皮疹出現時

	エピナスチン錠 20mg	１回１錠 皮疹出現時	アレルギーによるかゆみをしずめます。
	マイザー軟膏 ０．０５％	皮疹出現時	皮膚の炎症をおさえます。

※薬を開始し、２４時間経っても改善しない場合は病院に連絡して下さい。

インフルエンザ・ワクチンの接種について

不活化ワクチンですので、投与を禁止することはありません。

但し、過度の免疫反応により、ワクチン接種後の副反応（アナフィラキシー、発熱、注射部位の発赤、びらん等）が亢進・遅延することがありえます。少なくともワクチン接種後３０分間はアナフィラキシー反応の有無について慎重に観察し、帰宅後はすぐに医師と連絡を取れるようにして下さい。

おもな副作用

★★放射線性肺臓炎（約５４％）、肺臓炎（約１８％）、鼻咽頭炎（約１９％）★★

空気を取り込む肺胞という器官が炎症を起こす病気です。
痰のない乾いた咳（空咳）、息苦しさ・息切れ、発熱等の風邪のような症状がでた時は、
すぐに医療スタッフに伝え下さい。

注意すべき症状

- 痰のない乾いたひどい咳（空咳）
- ひどい息切れ、息苦しいさ
- 発熱

★★皮膚障害（そう痒症：約１９％、皮膚乾燥：約１５％、発疹：約１４％）★★

注意すべき症状

- 全身に発疹、赤い斑点や水ぶくれが出る
- まぶたや眼の充血、白目が黄色くなる

★★胃腸障害（下痢：約１３%、便秘：約１１%、食欲不振：約１５%）★★
下痢、口内炎、便秘、悪心・嘔吐、食欲不振
下痢や、大腸に炎症が起こる大腸炎を発症することがあります。初期症状は、下痢、排便回数の増加、腹痛、血便です。これらの症状とともに、発熱を伴う場合もあります。

注意すべき症状

- 下痢（軟便）あるいは排便回数が増える（１日に５回以上）
- 便に血が混じる、便が黒い
- 腹痛あるいは腹部の圧痛（押すなど圧迫した時に現れる痛み）
- ひどい吐き気や嘔吐がある
- ひどい口内炎

★★関節痛・筋肉痛（約7～8%）★★
筋力の低下、体のだるさ、痛み

★★甲状腺機能低下（約１１%）★★

★★発熱（約１１%）、上気道感染（約１１%）★★

★★倦怠感（約8%）★★

★★味覚異常（約3%）★★

★★Infusion reaction★★
投与中または投与 24 時間以内に発熱、悪寒、ふるえ、かゆみ、発疹、高血圧や低血圧（めまい、ふらつき、頭痛）、呼吸困難等が現れることがあります。
点滴中や点滴後 24 時間以内にこのような症状が出たら、医師、看護師、薬剤師にすぐに知らせましょう。

★１型糖尿病★
糖尿病を発症することがあります。定期的に血糖値検査を行います。
口渇、多飲、多尿の場合、血糖値の測定または尿糖検査をしてください。

★重症筋無力症・筋炎★
神経から筋肉への情報の伝達がうまくいかなくなる病気です。筋肉の炎症を伴うこともあります。

※上記以外の副作用も起こることがあります。

副作用は、起こる時期、副作用の程度、体のどの部分に起こるかなど

はっきりとは分からない場合があります。

いつもと違うと感じることがあれば、必ず申し出て頂くことが大切です。