

| レジメンコード | レジメン名 | コメント |
|----------|-------------------------------|---|
| 05A003 | 大腸FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ) | I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速)day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A004 | 大腸FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ) | I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速)day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A005 | 大腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ) | I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A006 | 大腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ) | I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A008 | 大腸Bmab+FOLFIRI外来用(ヘパフラッシュ) | Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A009 | 大腸Bmab+FOLFIRI入院用(ヘパフラッシュ) | Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A010 | 大腸Bmab+mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ) | Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A011 | 大腸Bmab+mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ) | Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡ (急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A020-a | 大腸Cmab単剤(初回) | Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1 1w毎 |
| 05A020-b | 大腸Cmab単剤(2回目以降) | Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1 1w毎 |
| 05A020-c | 大腸Cmab単剤(500mg/㎡)(初回) | Cet:500mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A020-d | 大腸Cmab単剤(500mg/㎡)(2回目以降) | Cet:500mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A024-a | 大腸Cmab+CPT-11(隔週)(初回) | Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A024-b | 大腸Cmab+CPT-11(隔週)(2回目以降) | Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A024-c | 大腸Cmab+CPT-11(500mg/㎡)(初回) | Cet: 500mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A024-d | 大腸Cmab+CPT-11(500mg/㎡)(2回目以降) | Cet: 500mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 |

| | | |
|----------|---|---|
| 05A025 | 大腸CPT-11単剤(隔週) | CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 通常のCPT-11を2w毎に2-3回投与し、その後3w休薬 |
| 05A026 | 大腸CapeOX(APR) | L-OHP:130mg/㎡ day1 カベシタピン:2000mg/㎡/day day1-14 3w毎 day1のL-OHP投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタピン2000mg/㎡/dayを1日2回朝・夕食後に経口投与する。 |
| 05A027 | 大腸Bmab+CapeOX(APR) | Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/㎡ day1 カベシタピン:2000mg/㎡/day day1-14 3w毎 |
| 05A027-a | 大腸Bmab+カベシタピン | Bev:7.5mg/kg day1 カベシタピン:2000mg/㎡/day day1-14 3w毎 |
| 05A028 | 大腸IRIS | CPT-11:100-125mg/㎡ day1,15 S-1:80mg/㎡ day1-14 4w毎 |
| 05A030-a | 大腸Pmab単剤(初回) | Pmab:6mg/kg day1 2w毎 |
| 05A030-b | 大腸Pmab単剤(2回目以降) | Pmab:6mg/kg day1 2w毎 |
| 05A034 | 大腸Pmab+CPT-11 | Pmab:6mg/kg day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A035 | 大腸Bmab+CPT-11 | Bev:5mg/kg day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 2w毎 |
| 05A036-a | 大腸Bmab+SOX(APR) | Bev:7.5mg/kg day1 L-OHP:130mg/㎡ day1 S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎 |
| 05A036-b | 大腸Bmab+SOX(L-OHP不耐) | Bev:7.5mg/kg day1 L-OHPは不耐のためOff S-1:80-120mg/day 1日2回 day1夕-day15朝 3w毎 |
| 05A040-a | 大腸Cmab+FOLFIRI(初回)(ヘパフラッシュ) | Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A040-b | 大腸Cmab+FOLFIRI(2回目以降)(ヘパフラッシュ) | Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A040-c | 大腸Cmab+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(初回) | Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A040-d | 大腸Cmab+FOLFIRI(ヘパフラッシュ)(500mg/㎡)(2回目以降) | Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A041-a | 大腸Cmab+mFOLFOX6入院用(初回)(ヘパフラッシュ) | Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |

| | | |
|----------|---|---|
| 05A041-b | 大腸Cmab+mFOLFOX6入院用(2回目以降)(へバ フラッシュ) | Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A042 | 大腸Pmab+FOLFOX(へバフラッシュ) | Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A043 | 大腸Pmab+FOLFIRI(へバフラッシュ) | Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:150mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A044 | 大腸Cmab+mFOLFOX6外来用(2回目以降)(へバ フラッシュ) | Cet: 250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1,8 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A044-a | 大腸Cmab+mFOLFOX6(へバ フラッシュ)(500mg/㎡)(初回) | Cet: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A044-b | 大腸Cmab+mFOLFOX6(へバ フラッシュ)(500mg/㎡)(2回目以降) | Cet: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A044-d | 大腸Cmab+mFOLFOX6入院用(500mg/㎡)(初回)(末梢投与) | Cet:500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A045 | 大腸Bmab+FOLFIRI入院用(FosAPR)(へバ フラッシュ) | Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応 |
| 05A046 | 大腸Bmab+FOLFIRI外来用(APR)(へバフラッシュ) | Bev:5mg/kg day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: day1 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PS0-1に適応 |
| 05A048 | 大腸RAM+FOLFIRI(へバフラッシュ)(APR) | Ram:8mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 I-LV:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可 |
| 05A049 | 大腸RAM+FOLFIRI(RAM単独) | Ram:8mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 I-LV:180mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 投与基準:尿蛋白1+の以下の時はラムシルマブ投与可 尿蛋白+2の時、24時間蓄尿による尿蛋白or尿蛋白/尿中クレアチニン比が2g未満で投与可 |
| 05A051 | 大腸Bmab+ I R I S | Bev:5mg/kg day1,15 CPT-11:100mg/㎡ day1,15 TS-1:80mg/㎡ day1夕～day15朝 4w毎 |
| 05A052 | 大腸mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】 | I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A061 | 大腸CapeIRI+Bmab | Bev:7.5mg/kg day1 CPT-11:200mg/㎡ day1 カベシタビン:1600mg/㎡/day day1-14 3w毎 day1のCPT-11投与終了後の夕からday15の朝まで、カベシタビン1600mg/㎡/dayを 1日2回朝・夕食後に経口投与する。 ※UGT1A1の検査を行うこと |
| 05A063 | 大腸Bmab+FTD/TPI | Bev:5mg/kg day1,15 TAS-102:70mg/㎡/day (35mg/㎡/回 分2) day1-5、day8-12 4w毎 |
| 05A064 | 大腸Bmab+mFOLFOX6入院用(末梢投与)【患者限定】 | Bev:5mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |

| | | |
|----------|--|--|
| 05A065-a | 大腸エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab(初回) | Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1 Encorafenib 300mg 1日1回 day1-7 Binimetinib 45mg/回 1日2回 day1-7 1w毎 |
| 05A065-b | 大腸エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cmab(2回目～) | Cet:250mg/㎡ (初回は400mg/㎡) day1 Encorafenib 300mg 1日1回 day1-7 Binimetinib 45mg/回 1日2回 day1-7 |
| 05A066 | 大腸Bmab+5-FU/I-LV外来用(ヘパフラッシュ)(維持療法) | Bmab:5mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A067 | 大腸Pmab+5-FU/I-LV 外来用(ヘパフラッシュ)(維持療法) | Pmab:6mg/kg day1 I-LV:200mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A068 | 大腸Cmab+5-FU/I-LV (ヘパ) (500mg/㎡)(2回目以降)(維持療法) | Cmab: 500mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |
| 05A069-a | 大腸Per+Tra(初回)(先発品使用) | Per:初回840mg/body day1 Tra:初回8mg/kg day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回量 前回治療から6週未満: 2回目以降量 |
| 05A069-b | 大腸Per+Tra(2回目以降)(先発品使用) | Per:420mg/body day1 Tra:6mg/kg day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回量 前回治療から6週未満: 2回目以降量 |
| 05A069-c | 大腸Per+Tra(前回投与から6週間以上)(先発) | Per:初回840mg/body day1 Tra:初回8mg/kg day1 3w毎 注) Per+Traは前回治療から6週以上: 初回量 前回治療から6週未満: 2回目以降量 |
| 05A070 | 大腸ニボルマブ(240mg/body)+イピリムマブ(1mg/kg)(MSI-High) | ニボルマブ:240mg/body day1 イピリムマブ:1mg/kg day1 3w毎 ※併用4コース終了3週後から、ニボルマブ単独投与(240mg 2w毎or480mg 4w毎)を繰り返す |
| 05A071 | 大腸ニボルマブ(240mg/body)(MSI-High) | ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎 |
| 05A072 | 大腸ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)(MSI-High) | ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎 |
| 05A073 | 大腸FOLFOXIRI入院用(APR)(ヘパフラッシュ) | L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PSO-1に適応 |
| 05A074 | 大腸FOLFOXIRI外来用(APR)(ヘパフラッシュ) | L-OHP:85mg/㎡ day1 I-LV:200mg/㎡ day1 CPT-11:165mg/㎡ day1 5-FU: 3200mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 PSO-1に適応 |
| 05A075 | 大腸Per+Tra(皮下注)(初回) | Per+Tra(フェスコIN皮下注): 15mL day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回レジメン 前回治療から6週未満: 2回目以降レジメン |
| 05A076 | 大腸Per+Tra(皮下注)(2回目以降) | Per+Tra(フェスコMA皮下注): 10mL day1 3w毎 注) 前回治療から6週以上: 初回レジメン 前回治療から6週未満: 2回目以降レジメン |
| 05C001 | 小腸mFOLFOX6外来用(ヘパフラッシュ) | I-LV:200mg/㎡ day1 L-OHP:85mg/㎡ day1 5-FU:400mg/㎡(急速) day1 2400mg/㎡(持続) day1-2 2w毎 |

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 05C002 | 小腸mFOLFOX6入院用(ヘパフラッシュ) | I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 |
| 05C003 | 小腸mFOLFOX6入院用(未梢投与)【患者限定】 | I-LV:200mg/m ² day1 L-OHP:85mg/m ² day1 5-FU:400mg/m ² (急速) day1 2400mg/m ² (持続) day1-2 2w毎 |
| 05C004 | 【適外】小腸PTX | PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎 |
| 05C005 | 【適外】小腸CPT-11単剤 | CPT-11:150mg/m ² day1 2w毎 |
| 14A002 | 肛門管5-FU+MMC(CRT) | 5-FU:1000mg/m ² day1-4 MMC:10mg/m ² day1 4w毎 4w1コースで、CRT中はday1とday29の計2コース投与する。 |
| 14A003 | 肛門管CDDP+5-FU(80-800)(FosAPR) | CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 3-4w毎 |
| 14A004 | 肛門管CDDP+5-FU(75-1000)(CRT用)(FosAPR) | CDDP:75mg/m ² day1 5-FU:1000mg/m ² day1-4 4w毎 4コースまで実施可能 |
| 14A006 | 【適外】肛門管CBDCA+weeklyPTX(APR) | CBDCA:AUC=5 day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 4w毎 |