

レジメンコード	レジメン名	コメント
10C006	悪性黒色腫イビリムマブ	イビリムマブ:3mg/kg day1 3w毎 4回まで ※処方医はE-learningが必要
10C008	悪性黒色腫IFN300(維持療法)	IFN- β :300万単位/body day1 ※術後療法投与終了日から最低3週間は空ける
10C011	悪性黒色腫DTIC療法(1日投与、APR)	DTIC:1000mg/m ² day1 3w毎 ルートも含め、遮光で投与すること。 また、刺入部を温庵
10C012	悪性黒色腫CBDCA+PTX(APR)	CBDCA:AUC=6 day1 PTX:200mg/m ² day1 3w毎
10C015	悪性黒色腫ニボルマブ(80mg/body)+イビリムマブ(3mg/kg)	ニボルマブ:80mg/body day1 イビリムマブ:3mg/kg day1 3w毎 ※併用4コース終了3週後から、ニボルマブ単独(240mg/body) (2w毎) 投与を繰り返す
10C016	悪性黒色腫ニボルマブ(240mg/body)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎
10C017	悪性黒色腫ベムプロリズマブ(200mg/body)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎
10C018	悪性黒色腫ベムプロリズマブ(200mg/body)(術後補助)	ベムプロリズマブ:200mg/body day1 3w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10C019	悪性黒色腫ニボルマブ(240mg/body)(術後補助)	ニボルマブ:240mg/body day1 2w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10C020	悪性黒色腫ベムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎
10C021	悪性黒色腫ベムプロリズマブ(6週毎)(400mg/body)(術後補助)	ベムプロリズマブ:400mg/body day1 6w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10C022	悪性黒色腫ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎
10C023	悪性黒色腫ニボルマブ(4週毎)(480mg/body)(術後補助)	ニボルマブ:480mg/body day1 4w毎 ※術後補助療法の場合は、投与期間は12ヶ月までとする。
10G001	皮膚腺癌WeeklyDOC	DOC:25mg/m ² day1,8,15 4w毎
10G003	皮膚腺癌WeeklyPTX	PTX:80mg/m ² day1 1w毎

10G004	皮膚腺癌Low dose FP(APR)	CDDP:10mg/body day1-5 5-FU:600mg/m ² day1-5 4w毎
10G005	【適外】 皮膚腺癌TriweeklyDOC	DOC:60mg/m ² day1 3w毎
10I001	メルケル細胞癌アベルマブ	アベルマブ:10mg/kg 2w毎 ※適応：根治切除不能なメルケル細胞癌
10I002	【適外】 メルケル細胞癌CDDP+ETP(APR)	CDDP:25mg/m ² day1-3, ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 標準量開始基準:Neut \geq 1500、PLT \geq 10万、CCr \geq 60 CCr 45-59はシスプラチンを80%に減量 放射線療法を同時併用することもある
10I003	【適外】 メルケル細胞癌CBDCA+ETP(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 標準量開始基準:Neut \geq 1500、PLT \geq 10万 放射線療法を同時併用することもある
10J001	有棘細胞癌CPT-11	CPT-11:100mg/m ² day1,8,15,22 6w毎 WBC 3000以上、PLT 10万以上
10J002	有棘細胞癌WeeklyCDDP+RT(FosAPR)	CDDP 40mg/m ² day1 1w毎 RT:2Gy/回 1日1回週5回
10J003	有棘細胞癌CDDP+ADR(FosAPR)	CDDP 75mg/m ² day1 ADR 50mg/m ² day1 3w毎 ※ADRの総投与量が500mg/m ² を超えない
10J004	【適外】 有棘細胞癌CDDP+5-FU(80-800)(FosAPR)	CDDP:80mg/m ² day1 5-FU:800mg/m ² day1-5 4w毎
10K001	基底細胞癌CDDP+ADR(FosAPR)	CDDP 75mg/m ² day1 ADR 50mg/m ² day1 3w毎 ※ADRの総投与量が500mg/m ² を超えない