

レジメンコード	レジメン名	コメント
07B090	【適外】 外陰・腔TC(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3-4w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07B091	【適外】 外陰Bmab+TC(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3-4w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07E004	絨毛疾患MTX+ACT-D	ACT-D:0.01mg/kg day1-4 MTX:0.4mg/kg day1-4 2w毎
13G001	嗅神経芽細胞腫CDDP+ETP	CDDP:80mg/m ² day1 ETP:100mg/m ² day1-3 3w毎 放射線同時併用療法を行うこともある
13G002	嗅神経芽細胞腫CPT-11+DOC	CPT-11:50mg/m ² day1,8,15 DOC:30mg/m ² day1,8,15 4w毎
13B005	神経膠腫テモロロニド注(単独)(2回目以降)	TMZ:150mg/m ² day1-5 4w毎 2クール目から200mg/m ² に増量可
13B006	神経膠腫テモロロニド注(単独)(初回)	TMZ:150mg/m ² day1-5 4w毎 2クール目から200mg/m ² に増量可
13B007	神経膠腫Bmab(2W)(単剤)	Bev:10mg/kg day1 2w毎
13B008	神経膠腫Bmab(3W)(単剤)	Bev:15mg/kg day1 3w毎
13B009	神経膠腫Bmab+テモロロニド+RT(初発：放射線併用)	Bev:10mg/kg day1 TMZ:75mg/m ² 連日投与 2w毎 RT:2Gy/日 週5回 総線量60Gy
13B010	神経膠腫Bmab+テモロロニド(初発：維持療法)	Bev:10mg/kg day1,15 TMZ:150mg/m ² /日 経口 day1-5 4w毎 TMZ 2クール目以降は忍容性が確認される場合は200mg/m ² /日に増量する
13B012	神経膠腫PAV	ACNU:80mg/m ² day1 VCR:1.4mg/m ² (max2mg/body) day8,29 PCZ:100mg/日 朝夕分2 day8-21 6w毎 テモロロニド1T朝day9-21 (症状が強い時は2T朝夕) RTを行う場合は、抗癌剤最終投与後6週間以内に開始する
13B014	【適外】 神経膠腫CBDCA+VCR(導入療法)	CBDCA:175mg/m ² day1,8,15,22,43,50,57,64 VCR:1.5mg/m ² (max:2mg/body) day1,8,15,22,29,36,43,50,57,64 1コース終了後維持療法に移行

13B015	【適外】 神経膠腫VBL	VBL:6mg/m ² (max 10mg/body) 1w毎 52~70週 有害事象、効果により投与期間を減じることがある。
--------	--------------	---