

レジメンコード	レジメン名	コメント
07A001	卵巣TC(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07A005	卵巣weekly TC	PTX:80mg/m ² day1,8,15 CBDCA:AUC=2 day1,8,15 4w毎
07A007	卵巣PLD	リボ`ソーマルト`キルビ`シ:50mg/m ² day1 4w毎
07A009	卵巣CPT-11	CPT-11:100mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A011	卵巣NGT単剤	ノゲテカン:1.5mg/m ² day1-5 3w毎
07A012	卵巣GEM単剤	GEM:1000mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A012AE	卵巣GEM単剤(副作用予防)	GEM:1000mg/m ² day1,8,15 4w毎
07A013	卵巣TN	PTX:175mg/m ² day1 CDGP:100mg/m ² day1 4w毎
07A014	卵巣胚細胞腫瘍BEP(APR)	CDDP:20mg/m ² day1-5 ETP:100mg/m ² day1-5 BLM:30mg/body day2,9,16 3w毎 BLMの総投与量は300mgを超えないこととする
07A016	卵巣Bmab+TC(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body ※手術後28日以内に1コース目を開始する場合にはBev抜き（卵巣TC（イメンド））で行う
07A017	卵巣Bmab	Bev:15mg/kg day1 3w毎
07A018	卵巣Bmab+PLD	Bev:15mg/kg day1 リボ`ソーマルト`キルビ`シ:40mg/m ² day1 4w毎 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること

07A020	卵巣Bmab+PTX	Bev:15mg/kg day1 PTX:80mg/m ² day1,8,15 3w毎
07A021	卵巣Bmab+NGT	Bev:15mg/kg day1 ノギテカン:1.25mg/m ² day1-5 3w毎
07A023	卵巣Bmab+GC(外来用)	Bev:15mg/kg day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎
07A023AE	卵巣Bmab+GC(外来用)(副作用予防)	Bev:15mg/kg day1 GEM:1000mg/m ² day1,8 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎
07A026	卵巣DC(APR)	DOC:70mg/m ² day1 CBDCA:AUC=5 day1 3-4w毎
07A027	卵巣PLD+CBDCA(APR)	リボソーマルトキシルシン:30mg/m ² day1 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること CBDCA:AUC=5 day1 4w毎
07A029	卵巣Bmab+オラパリブ	Bev:15mg/kg day1 3w毎 オラパリブ600mg/day 連日内服 ※相同組換え修復欠損を有する卵巣癌
07A030	卵巣Bmab+PLD+CBDCA(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 Bev:10mg/kg day1,15 リボソーマルトキシルシン(PLD):30mg/m ² day1 4w毎 ※90mgを超える場合は5%ブドウ糖液500mLで希釈すること 6コース実施後、維持療法としてBev単剤(15mg/kg 3w毎)に移行する
07A031	卵巣Bmab+DC(APR)	Bev:15mg/kg day1 DOC:70mg/m ² day1 CBDCA:AUC=5 day1 3-4w毎