

レジメンコード	レジメン名	コメント
07B001	子宮TP(FosAPR)	PTX:135mg/㎡ day1 CDDP:50mg/㎡ day2 3w毎 PTXは1 2時間ごと2 バッグに分けて調製する
07B002	子宮CCRT(CDDP)(FosAPR)	CDDP:40mg/㎡ day1 1w毎 1週毎5回投与 RTのスケジュールにより最大7回まで投与することがある RT併用
07B003	子宮AP(FosAPR)	ADR:60mg/㎡ day1 CDDP:50mg/㎡ day1 3w毎 6コース施行
07B007	子宮CDDP+CPT-11(FosAPR)	CDDP:60mg/㎡ day1 CPT-11:60mg/㎡ day1,8,15 4w毎
07B009	子宮CPT-11	CPT-11:100mg/㎡ day1,8,15 4w毎
07B010	子宮TC(APR)	CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/㎡ day1 3-4w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07B011	子宮CDDP単剤(FosAPR)	CDDP:50mg/㎡ day1 3-4w毎 3-6回投与
07B016	子宮TEC(FosAPR)	PTX:150mg/㎡ day1 epirubicin 50mg/㎡ day1 CBDCA:AUC=4 day1 3-4w毎 3-6回投与
07B017	子宮ADR	ADR:60mg/㎡ day1 3w毎
07B020	子宮DC(APR) 【患者限定】	DOC:60mg/㎡ day1 CBDCA:AUC=6 day1 3-4w毎
07B021	子宮Bmab+TP(FosAPR)	Bev:15mg/kg day1 PTX:135mg/㎡ day1 CDDP:50mg/㎡ day2 3w毎 PTXは1 2時間ごと2 バッグに分けて調製する
07B023	子宮Bmab+TC(APR)	Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/㎡ day1 3-4w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body
07B025	子宮(頸癌)NGT+CDDP(FosAPR)	ノギテカン:0.75mg/㎡ day1-3 CDDP:50mg/㎡ day1 3w毎 ※投与開始基準:好中球数 \geq 1500、血小板 \geq 10万
07B026	【患者限定】 子宮Bmab+PTX+CDGP(CDDP、CBDCA過敏症用)	Bev:15mg/kg day1 PTX:175mg/㎡ day1 CDGP:70mg/㎡ day1 3w毎 ※CDGP脱感作用:1.4mg/㎡ day1
07B027	子宮CCRT(APR)(short)	CDDP:40mg/㎡ day1 1w毎 1週毎5回投与 RTのスケジュールにより最大7回まで投与することがある RT併用

07B028	子宮Bmab(維持療法)	Bev:15mg/kg day1 3w毎 化学療法後の維持療法
07B029	子宮ベムプロリスマブ(200mg/body)+レンパチニブ	ベムプロリスマブ:200mg/body day1 3w毎 レンパチニブ:1日1回 20mg 連日内服
07B030	子宮ベムプロリスマブ(6週毎)(400mg/body)+レンパチニブ	ベムプロリスマブ:400mg/body day1 6w毎 レンパチニブ:1日1回 20mg 連日内服
07B031	子宮ベムプロリスマブ+Bmab+TC(APR)	Pembrolizumab:200mg/body Bev:15mg/kg day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3-4w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body ※6コースまで実施可能(延長の場合あり)、以後ベムプロリスマブ+Bevに移行
07B032	子宮ベムプロリスマブ+TC(APR)	Pembrolizumab:200mg/body day1 CBDCA:AUC=5 day1 PTX:175mg/m ² day1 3-4w毎 CBDCA最大投与量は1000mg/body ※6コースまで実施可能(延長の場合あり)、以後ベムプロリスマブ単剤に移行
07B033	子宮ベムプロリスマブ+Bmab+TP(FosAPR)	Pembrolizumab:200mg/body day1 Bev:15mg/kg day1 PTX:175mg/m ² day1 CDDP:50mg/m ² day2 3w毎 PTXは1 2時間ごと2バッグに分けて調製する ※6コースまで実施可能(延長の場合あり)、以後ベムプロリスマブ+Bevに移行
07B034	子宮ベムプロリスマブ+TP(FosAPR)	Pembrolizumab:200mg/body day1 PTX:175mg/m ² day1 CDDP:50mg/m ² day2 3w毎 PTXは1 2時間ごと2バッグに分けて調製する ※6コースまで実施可能(延長の場合あり)、以後ベムプロリスマブ単剤に移行
07B035	子宮ベムプロリスマブ(維持療法)	Pembrolizumab:200mg/body day1 3w毎 化学療法後の維持療法 ※Pembrolizumabは化学療法併用も含め35コースまで実施可能 *適応患者: 進行または再発子宮頸癌
07B036	子宮ベムプロリスマブ+Bmab(維持療法)	Pembrolizumab:200mg/body day1 Bev:15mg/kg day1 3w毎 化学療法後の維持療法 ※Pembrolizumabは化学療法併用も含め35コースまで実施可能 *適応患者: 進行または再発子宮頸癌
07B093	子宮セミプリマブ	セミプリマブ:350mg/body day1 3w毎 *適応患者: 進行・再発子宮頸癌