

大阪府におけるがん登録

第 6 1 報

- 1995年のがんの罹患と医療及び
1991年罹患者の5年相対生存率 -

平成 10 年 12 月

大阪府保健衛生部
大阪府医師会
大阪府立成人病センター

目次

頁

はじめに-----

方法

1. 登録から集計までの作業の概要

- (1) 患者登録-----
- (2) 患者予後調査-----
- (3) 医学的整合性と集計対象としての妥当性の検査-----
- (4) 集計と報告-----

2. 分類方法

- (1) 部位分類-----
- (2) 患者住所分類-----

3. 本報告の集計対象

- (1) 罹患率の集計対象-----
- (2) 臨床進行度と受療状況の集計対象-----
- (3) 生存率の集計対象-----
- (4) 死亡率の集計対象-----

4. 統計値の算定方法

- (1) 大阪府人口-----
- (2) 罹患率および死亡率-----
- (3) 生存率-----

成績

. 1995年のがん罹患率

1. 罹患数及び罹患率

- (1) 主要部位別罹患数、粗罹患率及び年齢調整罹患率-----
- (2) 全がん及び子宮頸部上皮内がんの罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率の年次推移-----
- (3) 主要部位の罹患数、粗罹患率及び年齢調整罹患率の年次推移-----
- (4) 罹患率と死亡率の大阪府と全国の比較-----
- (5) 年齢階級別罹患率-----
- (6) 年齢階級別部位分布-----
- (7) 地域別年齢調整罹患率-----

2. 登録の精度

- (1) 届出の精度-----
- (2) 診断の精度-----

1995年届出罹患者の臨床進行度と受療状況	
3. 受診の経緯-----	
4. 臨床進行度分布-----	
5. 検査及び治療	
(1) 部位別比較-----	
(2) 手術実施割合の推移-----	
(3) 11地域別比較-----	
(4) 年齢階級別比較-----	
6. 手術内容-----	
1991年届出罹患者の生存率	
7. 5年相対生存率	
(1) 部位別生存率と年次推移-----	
(2) 臨床進行度別生存率-----	
1995年のがん死亡率とがん患者の死亡時の医療	
8. 死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率	
(1) 主要部位別がん死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率-----	
(2) 年齢調整死亡率の年次推移-----	
(3) 年齢階級別死亡率の年次推移-----	
9. がん患者の死亡時の医療	
(1) がん死亡者の剖検実施割合-----	
(2) がん死亡者の死亡場所-----	
文献-----	
付表-----	

大阪府保健衛生部、大阪府医師会、大阪府立成人病センター：大阪府におけるがん登録第61報 - 1995年のがんの罹患と医療及び1991年罹患者の生存率 - 大阪府保健衛生部 . 1998 .

Osaka Prefectural Department of Public Health, Osaka Medical Association, Osaka Medical Center for Cancer and Cardiovascular Diseases: Annual Report of Osaka Cancer Registry No.61 - Cancer Incidence and Medical Care in Osaka in 1995 and the Survival in 1991 -. OPDPH, 1998.

はじめに

大阪府では、大阪府保健衛生部、大阪府医師会、大阪府立成人病センターが協力して、1962年から大阪府全域を対象とする悪性新生物患者登録事業を実施し、毎年、がんの罹患、がん患者の医療、予後についての成績を年報として報告してきた。

本報告では、1995年に初めてがんと診断された患者（罹患患者）の罹患率と受療状況、同年のがんによる死亡率、及び1991年罹患患者中の大阪府在住届出患者についての5年生存率を報告する。

方 法

1．登録から集計までの作業の概要

(1) 患者登録

がん患者登録は、1)府内医療機関からの届出票による登録と、2)がん死亡情報からの補完登録、との2段階で行われる。また、3)1人の患者に独立して発生した複数の腫瘍（多重がん）を区別して登録している。

1)届出票による登録

大阪府医師会は、府内医療機関に対し、がん患者の届出を依頼する。各医療機関から郵送されてくる届出票の件数を毎月集計し、集計結果を大阪府へ報告するとともに、医療機関コードを付与したのち、府立成人病センター調査部に届出票を送付する。

府立成人病センター調査部では、新規届出票の医学的記載内容を調べ、原発部位¹⁾、病理組織所見²⁾などをコード化したのち入力し、新規届出票ファイルを作成する。まず、この新規届出票ファイルの内部で患者照合³⁾（1次照合）を行う。即ち、電算機上で、患者の生年月日、姓の第1字の読み（特定の読み方を与えている）、性別、住所、及び腫瘍の原発部位の5項目の一致状況を新規届出票間の全ての組み合わせ（ペア）で確認し、この5項目の一致状況に応じて、同一人物、同一人物の可能性あり、別人に分類する。及びは、リストに出力し、同一人物であるか否かを確認、判定する。この患者同定作業は、正確な罹患統計を得るためには、必須かつ重要な作業である。即ち、同じ患者に由来する届出が、同定できずに別の患者として登録されると、罹患数を過剰に計上することになる。以上の作業は、年1回のペースのバッチ処理にて行っている。なお、後述する2 - 3次照合も、これと同じ方法で行っている。このようにして、まず、新規届出票ファイルから、同一人物の同定を済ませた新規届出患者ファイルを作成する。次いで、このファイルと既登録患者ファイル（マスターファイル：1998年7月現在、59万人(114万件)分を収録）との間で同様に患者照合(2次照合)し、新規患者か既登録患者かを判別したのち、新規患者をマスターファイルに登録し、既登録患者の届出情報を追加入力する。

2)がん死亡情報からの補完登録

次に、がん死亡情報から作成した「がん死亡票」の内容を届出票と同様にコード化して入力し、「新規がん死亡情報ファイル」を作成する。このファイルと、マスターファイル中の生存患者とを照合(3次照合)することによって、登録患者のがんによる死亡を確認し、死亡情報をマスターファイルに追加入力する。同時に、医療機関から届出されていないがん死亡者を補完登録する。また、死亡情報から補完登録された患者について、生前の受療状況の情報収集に努める。

3)多重がんの判定

多重がんが発生した場合には、それぞれの腫瘍を別々に登録、集計するため、これらの照合作業では、患者同定と同時に腫瘍の同定^{2,4,5)}をも行う。即ち、がんの原発部位の記載が届出票間で異なる場合、これらが同一腫瘍の転移、再発などについての情報であるのか、多重がん発生の報告であるのかを、IARC/IACRの多重がんの定義に従い、病理組織所見、先発がんの治療成功度などを参照し、病理医の意見を参考にしつつ判定する。判定困難な場合は、届出医療機関へ照会する。

(2) 患者予後調査

予後調査は、登録患者について、1)がんによる死亡の把握、2)他死因による死亡の把握、3)生存確認、の3段階をもって実施している⁶⁾。

1)は、患者登録の第2段階で実施する大阪府在住者の「がん死亡情報ファイル」とマスターファイルの中の生存者との照合によって行われる。

2)では、マスターファイル中の生存患者と、大阪府在住者の全死亡情報(厚生省人口動態死亡統計大阪府分のファイル)との間で患者照合(他死因照合)を実施する。

3)として、診断から5年及び10年経過した時点で死亡情報を持っていない患者をマスターファイルから選出して、生存確認調査を実施する。この調査では、大阪府(大阪市を除く)在住の届出患者を対象とし、堺市、東大阪市及び大阪府の各保健所の協力を得て、患者住所地市町村役場で住民票を閲覧し、生存、死亡、転居を調査する。調査で患者の転居が判明した場合には、転居先市区町村に対し、さらに確認調査を継続実施する。

(3) 医学的整合性と集計対象としての妥当性の検査

1) 入力時検査

登録情報は、入力時に、電算機により範囲検査を行い、また、同一票内部の項目相互間で論理矛盾がないかを調べる。

2) 照合後の検査

照合によって、複数の票が同一患者に属することが明らかになった時、患者を同定するために必要な項目が票間で異なれば、これを統一する。

3) 集計前の医学的整合性の検査と集計対象としての妥当性の検査

1年間の全ての新規情報がマスターファイルに登録された時点で、同一患者に属する複数票の間で、項目相互間に論理矛盾がないかを検査する。疑診、性状不詳、上皮内がんの記載がある患者では、その後、悪性を確診する検査や治療結果が登録されているか否かを検査する。前2者では、登録から除外するか、集計対象からは除外するが次の点検(生存率集計前)まで登録を継続するかを決定する。

検査は電算機で行い、判定を必要とする症例のみリストに印字させる。判定は調査部職員が行う。

(4) 集計と報告

上記の検査が完了した後、集計対象年の患者のデータを抽出、編集し、集計ファイルを作成して、集計を行う。集計には次の2種がある。

1) 患者住所地によるがん罹患集計及びがん患者受療状況集計。これを解析し、年報「大阪府におけるがん登録」、学会報告などを作成する。

2) 患者が訪れた医療機関による医療機関別患者集計。各医療機関別の患者数を要請があれば報告する。

2. 分類方法

(1) 部位分類

がんの原発部位の分類には、従来、国際疾病分類第9回修正(ICD-9)⁷⁾により行ってきたが、今回の報告より国際疾病分類第10回修正(ICD-10)¹⁾を使用した。本文に記載の部位についてICD-10による定義と表記を表にまとめた。詳細については、付表1の表頭を参照いただきたい。

表 本文の表中の各部位の表記とそのICD-10による定義

部位	国際疾病分類 (ICD-10)	表記
全部位	C00-C96	全部位
食道	C15	食道
胃	C16	胃
結腸	C18	結腸
直腸	C19-C21	直腸
肝及び肝内胆管	C22	肝臓
胆のう及び肝外胆管	C23-24	胆のう
膵臓	C25	膵臓
気管 気管支及び肺	C33-34	肺
乳房	C50,D05	乳房
子宮(頸部上皮内がんを含む)	C53-C55,D06	子宮(1)
子宮(頸部上皮内がんを除く)	C53-C55	子宮(2)
卵巣	C56	卵巣
前立腺	C61	前立腺
膀胱	C67	膀胱
リンパ組織	C81-C90,C96	リンパ組織
白血病	C91-C95	白血病

大阪府がん登録の届出対象は、悪性新生物(ICD-10: C00-96)の他に、上皮内がん(同: D00-D09)と頭蓋内の良性及び性状不詳の新生物(同: D320、D33、D352-D354等)が含まれており、本報告の部位別集計では、これらを含めた数値を悪性新生物の部位コードを用いて示した。但し、「全がん(全部位)」では、子宮頸部及び乳房の上皮内がん(同: D06とD05)を除いた値、「子宮」の項では、頸部上皮内がんを含めた値「子宮(1)」と除いた値「子宮(2)」を示した。なお、ICD-10から「独立した(原発性)多部位の悪性新生物(重複がん)」が新たな項目(C97)として追加されたが、罹患統計では、従来から、重複がんのある患者では、それぞれの腫瘍について情報を作成・登録しているため、C97を用いていない。死亡統計では「全がん(全部位)」にC97を含めた。

(2) 患者住所分類

患者住所には、その患者を最も早くがんと診断した医療機関が届け出た患者住所を採用した。

地域別の集計では、大阪府保健医療計画における医療圏の分類に則り、8二次医療圏及びその内大阪市をさらに4基本医療圏に分別した。併せて、行政単位である市区町村別にも示した。

3. 本報告の集計対象

(1) 罹患率の集計対象

本報告の罹患集計対象は、大阪府在住者(外国人を含む)から、1995年に初めて診断された“がん”とした。居住地不詳の患者(96人)は除いた。

「死亡情報によって登録されたがん患者」は、厚生省がん研究助成金による「地域がん登録」研究班が作成した「地域がん登録の手引き」⁸⁾に従い、死亡年月を「診断年月」として集計に加えた。

(2) 臨床進行度と受療状況の集計対象

がん患者の受診の経緯、診断時の臨床進行度、及び検査・治療状況の集計では、1995年の罹患者のうち、1)死亡情報のみで登録されている患者(以下「死亡票のみの者」という)、及び2)再発時の情報が得られなかった患者、の両者を除く新発生届出患者を対象とした。

(3) 生存率の集計対象

生存率集計では、大阪市を除く大阪府在住患者を対象とした。本報告では、1991年のがん罹患患者中、

「死亡票のみの者」を除いた届出患者を集計対象とした。なお、「死亡情報によって登録されたがん患者」のうち、生前の受療状況に関する情報が得られた患者では、死亡年月ではなく得られた診断日を「診断年月」として生存率集計対象の抽出に用いた。

(4) 死亡率の集計対象

死亡集計では、大阪府在住者中、1995年にがんが原因で死亡した者を対象とした。集計には、許可をえて、厚生省人口動態死亡統計大阪府分のファイルを使用した。なお、本報告の死亡集計には、日本人人口に限らず大阪府在住の外国人を含めた。

4. 統計値の算定方法

(1) 大阪府人口

1995年のがん罹患率、死亡率の計算に用いた大阪府人口を、付表20(性別、年齢階級別)及び付表21(性別、11地域別)に示した。これは、外国人を含む総人口で、1995年の国勢調査人口⁹⁾である。

(2) 罹患率及び死亡率

罹患率及び死亡率は、いずれも性別の罹患数(死亡数)を性別の人口で除し、人口10万に対する罹患数(死亡数)として示した。

年齢階級別罹患率(死亡率)は、年齢階級別の罹患数(死亡数)を、それぞれの年齢階級別人口で除し、同様に人口10万に対する罹患数(死亡数)として示した。粗罹患率(死亡率)は、全年齢についての罹患率(死亡率)を指す。

0-74歳の累積罹患率(死亡率)は、74歳までの各歳別人口10万対罹患率(死亡率)を総和したものである¹⁰⁾。

異なる年、異なる地域との比較にあたっては、対象人口の年齢構成の違いがもたらす影響を除いた年齢調整罹患率(死亡率)を用いたが、その場合の標準人口には、Dollの「世界人口」¹⁰⁾を使用した(付表22)。また、人口規模の小さい地域単位(市区町村)については、標準化罹患比⁴⁾を算出し、付表に示した。その場合、全大阪府の性、年齢階級別罹患率を標準とした。

(3) 生存率

生命表方式に基づき、患者の5年累積(実測)生存率を算出した¹¹⁾。さらに、患者群と同じ性・年齢分布をもつ日本の一般人の集団での期待生存率を別に算出し、前者を後者で除して相対生存率とした。期待生存率の算出にあたっては、全国人口での暦年別・性別・各歳別死亡率から計算されたコホート生存率表¹²⁾を使用した。

集計対象の定義及び期待生存率の計測方法については、厚生省がん研究助成金による「地域がん登録」研究班が推奨する生存率計測の標準方式(案)に従い¹³⁾、この方法を用いて再集計した1975-1989年診断患者の生存率¹⁴⁾と比較した。即ち、(1)上皮内がんを除く。(2)多重がんの場合は、第1がんのみを集計対象に含め、第2がん以降を集計対象から除外する。(3)期待生存率の計算方法として、観察開始時点における性・年齢分布に基づくEderer法ではなく、対象者による観察期間の違いを考慮したEderer法を採用する。

これら統計値の計算方法については、文献4、11及び13を参照されたい。

成 績

・1995年のがん罹患率

1. 罹患数及び罹患率

(1) 主要部位別罹患数、粗罹患率及び年齢調整罹患率

表 1-A に、1995 年のがん罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率及び罹患割合を、主要部位別、性別に示した。また、表 1-B に上皮内がんの成績を示した。

1995 年の全がん罹患数は、男女計で 27,973 人となり前年より 1,325 人増加した。人口 10 万人当たりの粗罹患率は 318.0、世界人口による年齢調整罹患率は 198.5 となった。部位別罹患数(男女計)では、胃がんが依然として最も多く、全がんに対して 19.2%を占めた。次いで肺が 2 位、肝が 3 位、以下、結腸、乳房、直腸、膵臓、子宮(頸部上皮内がんを含む)、胆のう、子宮(頸部上皮内がんを除く)、リンパ組織の順となった。

性別に、罹患数の多いものから順に 10 位までの部位とその割合を、図 1 に示した。ただし、図 1 では、結腸と直腸は一括して大腸と表示した。

表 1-B に示した上皮内がんの総数は 715 人で、前年より 329 人増加した。これは、結腸、直腸における粘膜内がんを上皮内がんを含めたことにより増加したものである。なお、国際疾病分類の 3 桁(一部 4 桁)分類による性別・部位別の罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率及び累積率(0-74 歳)を付表 1-A に、また、罹患割合、届出と診断の精度並びに罹患者の平均年齢を付表 1-B に示した。

表 1 罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率*(人口 10 万対)及び罹患割合(%);主要部位別、性別

A. 主要部位別

部 位	罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率*			罹患割合(%)		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
	全部位	16,471	11,502	27,973	381.1	257.0	318.0	264.6	149.5	198.5	100.0	100.0
食道	630	128	758	14.6	2.9	8.6	9.7	1.5	5.2	3.8	1.1	2.7
胃	3,553	1,814	5,367	82.2	40.5	61.0	56.1	22.1	37.2	21.6	15.8	19.2
結腸	1,496	1,179	2,675	34.6	26.3	30.4	23.8	14.5	18.4	9.1	10.3	9.6
直腸	855	520	1,375	19.8	11.6	15.6	13.4	6.6	9.6	5.2	4.5	4.9
肝臓	2,635	955	3,590	61.0	21.3	40.8	41.8	11.4	25.5	16.0	8.3	12.8
胆のう	409	466	875	9.5	10.4	10.0	6.5	5.2	5.7	2.5	4.1	3.1
膵臓	584	426	1,010	13.5	9.5	11.5	9.2	4.8	6.7	3.5	3.7	3.6
肺	2,654	1,140	3,794	61.4	25.5	43.1	42.1	13.1	25.3	16.1	9.9	13.6
乳房	7	1,736	1,743	0.2	38.8	19.8	0.1	26.2	13.6	0.0	15.1	6.2
子宮(1)	・	943	943	・	21.1	10.7	・	13.8	7.3	・	8.2	3.4
子宮(2)	・	818	818	・	18.3	9.3	・	11.4	6.1	・	7.1	2.9
卵巣	・	345	345	・	7.7	3.9	・	5.1	2.7	・	3.0	1.2
前立腺	547	・	547	12.7	・	6.2	8.7	・	3.5	3.3	・	2.0
膀胱	462	173	635	10.7	3.9	7.2	7.3	1.9	4.2	2.8	1.5	2.3
リンパ組織	469	328	797	10.9	7.3	9.1	7.8	4.2	5.8	2.8	2.9	2.8
白血病	264	187	451	6.1	4.2	5.1	5.7	3.4	4.5	1.6	1.6	1.6

子宮(1)は頸部上皮内がんを含む。(2)は頸部上皮内がんを除く。以下の表でも同じ。

なお、子宮頸部及び乳房の上皮内がんは、全部位には含まれていない。


* 標準人口は世界人口。以下も同じ。

B. 上皮内がん、主要部位別

部 位	罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率			罹患割合(%)		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
	全部位	365	350	715	8.5	7.8	8.1	5.7	5.5	5.5	100.0	100.0
口唇, 口腔	2	2	4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6
食道	16	2	18	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	4.4	0.6	2.5
結腸・直腸	260	119	379	6.0	2.7	4.3	4.0	1.6	2.7	71.2	34.0	53.0
喉頭	4	0	4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.6
肺	5	1	6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4	0.3	0.8
皮膚*	20	26	46	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	5.5	7.4	6.4
乳房	0	47	47	0.0	1.1	0.5	0.0	0.7	0.4	0.0	13.4	6.6
子宮	・	139	139	・	3.1	1.6	・	2.7	1.3	・	39.7	19.4
膀胱	47	10	57	1.1	0.2	0.7	0.7	0.1	0.4	12.9	2.9	8.0
他の泌尿器	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1

* 悪性黒色腫を含む

図1 部位別罹患割合(%);主要10部位別、性別



(2) 全がん及び子宮頸部上皮内がんの罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率の年次推移

表2-Aでは全がん、表2-Bでは子宮頸部の上皮内がんについて、罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率の年次推移を示した。

全がん罹患数及び粗罹患率は、男女とも1966-68年以降一貫して上昇していた。年齢調整罹患率は、男では、1969-71年に最も低く、それ以後は次第に増加したが、1987-89年にピークを形成し、以後は減少傾向にある。女では、1975-77年に最も低く、その後増加に転じたが、男と同じく1987-89年にピークを形成し、1990年以降水平に推移している。ただし、1989年以降、届出もれが以前に比し多くなっており(後述)、最近の罹患率の減少が見かけだけのものである可能性もある。

表2-Bに示した子宮頸部の上皮内がん罹患数は、1975-77年以降1990-92年まで大きな変化はなかったが、1995年では減少した。

表2 罹患数、粗罹患率及び年齢調整罹患率(人口10万対)の推移;性別

A. 全部位

罹患年	罹患数(年平均)			粗罹患率			年齢調整罹患率		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
1966-68	5,213	4,673	9,886	147.1	133.5	140.4	207.0	150.5	175.0
1969-71	5,692	5,018	10,710	149.3	132.5	140.9	202.3	144.2	169.1
1972-74	6,290	5,580	11,871	156.9	139.3	148.1	202.7	143.7	168.6
1975-77	7,291	6,093	13,384	175.8	146.1	160.9	212.8	141.3	171.5
1978-80	8,437	6,816	15,253	201.4	160.6	180.8	225.6	143.3	177.9
1981-83	9,956	7,736	17,692	235.2	179.1	206.9	247.5	150.3	190.8
1984-86	11,846	8,850	20,696	276.4	202.0	238.8	263.9	153.9	200.1
1987-89	13,531	9,858	23,389	314.7	223.6	268.6	274.1	156.9	206.1
1990-92	14,428	10,275	24,703	334.6	231.7	282.4	268.3	150.6	200.1
1995	16,471	11,502	27,973	381.1	257.0	318.0	264.6	149.5	198.5

B. 子宮頸部の上皮内がん

罹患年	罹患数(年平均)			粗罹患率			年齢調整罹患率		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計
1966-68	・	33	33	・	0.9	0.5	・	0.9	0.5
1969-71	・	72	72	・	1.9	1.0	・	1.8	0.9
1972-74	・	129	129	・	3.2	1.6	・	3.0	1.5
1975-77	・	205	205	・	4.9	2.5	・	4.3	2.2
1978-80	・	180	180	・	4.2	2.1	・	3.5	1.8
1981-83	・	174	174	・	4.0	2.0	・	3.2	1.6
1984-86	・	206	206	・	4.7	2.4	・	3.6	1.8
1987-89	・	195	195	・	4.4	2.2	・	3.5	1.8
1990-92	・	214	214	・	4.8	2.4	・	3.9	2.0
1995	・	125	125	・	2.8	1.4	・	2.4	1.2

表3 主要部位別罹患数、粗罹患率及び年齢調整罹患率の推移

A. 罹患数(年平均)の推移

- 男女計 -

罹患年/部位	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(1)	子宮(2)	膀胱	卵巣	組織	白血病
1966-68	9,886	327	3,941	181	300	612	74	224	672	389	1,096	1,063	178	188	202	
1969-71	10,710	339	4,039	322	353	665	133	260	834	452	1,086	1,014	193	232	248	
1972-74	11,871	355	4,186	409	401	810	189	291	1,095	568	1,180	1,051	234	271	272	
1975-77	13,384	358	4,359	560	517	999	237	350	1,420	669	1,274	1,069	255	346	334	
1978-80	15,252	388	4,543	728	622	1,323	337	463	1,706	830	1,185	1,005	341	393	339	
1981-83	17,692	407	4,807	954	757	1,879	452	573	2,003	1,043	1,167	993	404	527	381	
1984-86	20,696	491	5,247	1,260	878	2,424	615	663	2,542	1,193	1,159	953	478	598	406	
1987-89	23,389	543	5,344	1,653	1,030	2,971	724	853	2,935	1,454	1,073	877	558	664	449	
1990-92	24,703	636	5,139	2,097	1,179	3,292	780	919	3,245	1,486	1,025	811	533	719	442	
1995	27,973	758	5,367	2,675	1,375	3,590	875	1,010	3,794	1,743	943	818	635	797	451	
1995/1966-68	2.8	2.3	1.4	14.8	4.6	5.9	11.8	4.5	5.6	4.5	0.9	0.8	3.6	4.2	2.2	
1995/1975-77	2.1	2.1	1.2	4.8	2.7	3.6	3.7	2.9	2.7	2.6	0.7	0.8	2.5	2.3	1.4	

B. 粗罹患率(人口10万対)の推移

- 男女計 -

罹患年/部位	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(1)	子宮(2)	膀胱	卵巣	組織	白血病
1966-68	140.4	4.7	56.0	2.6	4.3	8.7	1.1	3.2	9.5	5.5	15.6	15.1	2.5	2.7	2.9	
1969-71	140.9	4.5	53.1	4.2	4.6	8.8	1.8	3.4	11.0	6.0	14.3	13.3	2.5	3.1	3.3	
1972-74	148.1	4.4	52.2	5.1	5.0	10.1	2.4	3.6	13.7	7.1	14.7	13.1	2.9	3.4	3.4	
1975-77	160.9	4.3	52.4	6.7	6.2	12.0	2.9	4.2	17.1	8.1	15.3	12.9	3.1	4.2	4.0	
1978-80	180.8	4.5	53.9	8.6	7.4	15.7	4.0	5.5	20.2	9.8	14.1	11.9	4.0	4.7	4.0	
1981-83	206.9	4.8	56.2	11.2	8.9	22.0	5.3	6.7	23.4	12.2	13.7	11.6	4.7	6.2	4.5	
1984-86	238.8	5.7	60.5	14.5	10.1	28.0	7.1	7.7	29.3	13.8	13.4	11.0	5.5	6.9	4.7	
1987-89	268.6	6.2	61.4	19.0	11.8	34.1	8.3	9.8	33.7	16.7	12.3	10.1	6.4	7.6	5.2	
1990-92	282.4	7.3	58.7	24.0	13.5	37.6	8.9	10.5	37.1	17.0	11.7	9.3	6.1	8.2	5.1	
1995	318.0	8.6	61.0	30.4	15.6	40.8	10.0	11.5	43.1	19.8	10.7	9.3	7.2	9.1	5.1	
1995/1966-68	2.3	1.8	1.1	11.7	3.6	4.7	9.1	3.6	4.5	3.6	0.7	0.6	2.9	3.4	1.8	
1995/1975-77	2.0	2.0	1.2	4.5	2.5	3.4	3.4	2.7	2.5	2.4	0.7	0.7	2.3	2.2	1.3	

C. 年齢調整罹患率(人口10万対)の推移

C-1.

- 男女計 -

罹患年/部位	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(1)	子宮(2)	膀胱	卵巣	組織	白血病
1966-68	175.0	6.2	71.1	3.2	5.3	11.3	1.4	4.0	12.4	6.3	18.0	17.5	3.4	3.2	3.1	
1969-71	169.1	5.6	64.8	5.1	5.6	10.8	2.2	4.2	13.7	6.6	16.1	15.2	3.2	3.5	3.5	
1972-74	168.6	5.3	60.0	5.8	5.7	11.8	2.8	4.2	16.1	7.5	15.6	14.1	3.5	3.7	3.6	
1975-77	171.5	4.8	55.9	7.2	6.6	13.1	3.1	4.6	18.7	8.0	15.3	13.1	3.4	4.4	4.1	
1978-80	177.9	4.5	52.7	8.5	7.1	15.8	4.0	5.5	20.2	9.0	13.0	11.3	4.0	4.6	4.1	
1981-83	190.8	4.5	51.1	10.3	8.1	20.6	4.9	6.2	21.6	10.6	12.0	10.4	4.4	5.8	4.5	
1984-86	200.1	4.7	50.0	12.0	8.4	23.8	5.8	6.4	24.2	11.1	10.9	9.1	4.5	6.0	4.6	
1987-89	206.1	4.7	46.4	14.3	9.0	26.5	6.1	7.3	25.0	12.7	9.5	7.7	4.8	6.0	4.8	
1990-92	200.1	5.1	40.6	16.6	9.5	27.0	5.9	7.2	25.1	12.3	8.7	6.7	4.1	6.2	4.4	
1995	198.5	5.2	37.2	18.4	9.6	25.5	5.7	6.7	25.3	13.6	7.3	6.1	4.2	5.8	4.5	
1995/1966-68	1.1	0.8	0.5	5.8	1.8	2.3	4.1	1.7	2.0	2.2	0.4	0.3	1.2	1.8	1.5	
1995/1975-77	1.2	1.1	0.7	2.6	1.5	1.9	1.8	1.5	1.4	1.7	0.5	0.5	1.2	1.3	1.1	

C-2.

- 男 -

罹患年/部位	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	前立腺	膀胱	卵巣	組織	白血病
1966-68	207.9	9.7	98.8	4.8	6.1	16.5	1.5	5.5	20.3	0.2	3.0	5.3	4.5	3.6	
1969-71	202.5	9.2	90.3	5.7	6.9	15.6	2.4	5.4	22.7	0.1	2.8	5.5	4.6	4.0	
1972-74	203.8	9.1	83.4	6.2	7.5	17.9	2.6	5.5	26.1	0.2	3.4	6.0	5.1	4.2	
1975-77	215.1	8.4	79.0	8.7	8.6	21.4	3.2	5.9	31.9	0.1	4.0	6.1	6.0	5.0	
1978-80	236.5	7.8	78.8	10.7	10.1	27.5	4.2	7.2	35.1	0.2	4.8	7.4	6.7	5.3	
1981-83	253.7	7.8	75.8	12.8	11.3	35.9	5.3	7.9	37.6	0.1	5.5	8.2	8.0	5.6	
1984-86	272.9	8.8	75.1	15.0	12.2	42.8	5.8	8.7	42.3	0.2	7.0	8.6	8.5	5.8	
1987-89	274.1	8.7	68.3	18.0	12.6	45.4	6.3	9.5	42.8	0.2	7.0	8.7	7.8	6.0	
1990-92	268.3	9.4	60.9	21.3	12.9	45.6	6.3	9.7	43.3	0.1	6.4	7.3	8.0	5.4	
1995	264.6	9.7	56.1	23.8	13.4	41.8	6.5	9.2	42.1	0.1	8.7	7.3	7.8	5.7	

C-3.

- 女 -


罹患年/部位	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(1)	子宮(2)	卵巣	膀胱	卵巣	組織	白血病
1966-68	150.5	3.4	48.8	3.8	4.8	7.2	1.2	2.8	6.2	11.9	34.2	33.3	2.2	2.0	2.1	2.6	
1969-71	143.3	2.9	44.7	4.6	4.6	7.0	2.1	3.1	6.7	12.5	30.4	28.7	2.9	1.5	2.5	3.1	
1972-74	143.3	2.4	41.7	5.5	4.3	6.9	2.9	3.2	8.1	14.4	29.6	26.6	3.3	1.7	2.7	3.1	
1975-77	143.2	2.0	38.9	6.2	5.1	6.3	3.1	3.5	8.9	16.1	29.4	25.1	3.6	1.7	3.2	3.4	
1978-80	151.5	2.2	37.9	7.5	5.8	7.0	3.9	4.1	10.0	18.8	27.5	23.0	4.4	2.1	3.6	3.6	
1981-83	155.8	2.0	34.2	8.9	6.5	8.7	4.7	4.8	10.7	21.5	24.9	20.9	5.0	2.0	4.3	4.0	
1984-86	159.5	1.8	33.4	10.3	6.3	9.9	6.0	4.8	11.9	22.3	21.9	18.0	5.5	2.1	4.6	3.8	
1987-89	156.9	1.6	29.7	11.6	6.3	10.7	6.1	5.5	12.3	24.2	17.9	14.4	5.4	1.9	4.7	3.8	
1990-92	150.6	1.6	25.0	13.1	6.8	11.3	5.6	5.2	12.2	23.4	16.6	12.7	5.4	1.8	4.7	3.6	
1995	149.5	1.5	22.1	14.5	6.6	11.4	5.2	4.8	13.1	26.2	13.8	11.4	5.1	1.9	4.2	3.4	

(3) 主要部位の罹患数、粗罹患率及び年齢調整罹患率の年次推移

表 3A、3B、3C-1 には、男女計について、主要部位の罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率の年次推移を示した。胃がんの罹患数は1987-89年にピークを形成した後は、減少に転じていたが、1995年には増加した。子宮がんは減少傾向が持続していた。その他は、ほとんどの部位で、罹患数は増加傾向を示した。1995年罹患数の1975-77年に対する比は、全がんで2.1となり、結腸、胆、肝、膵、直腸、肺、乳房、膀胱の各がんでは2.5以上と大きかった。

表 3C - 2、3C - 3 及び図 2 に、主要部位の年齢調整罹患率の年次推移を性別に示した。女性では、乳がんの罹患率が胃がんを抜いて最も高くなった。胃がん及び子宮がんでは減少傾向が持続し、結腸がんでは増加傾向が持続していた。その他の多くの部位では、1984-86 年まで増加し、1987-89 年から水平移行か減少傾向が観察されるが、これについては届出もれの影響を考慮し、今後の動向を慎重に観察する必要がある。

図 2 年齢調整罹患率の年次推移；主要部位別、性別



(4) 罹患率と死亡率の大阪府と全国の比較

表 4 では、1995 年の大阪府の年齢調整罹患率と全国の年齢調整罹患率(1993 年推計値)とを対比するとともに、大阪と全国の年齢調整死亡率(1995 年値)をも比較した。罹患率の全国値は、厚生省がん研究助成金による「地域がん登録」研究班が、7 府県市(山形県・千葉モデル地域・神奈川モデル地域・福井県・大阪府・広島市・長崎県)の地域登録の成績から推計した最新値¹⁵⁾である。

全がんの年齢調整罹患率で大阪府の全国に対する比をみると、男は全国値並み(1.01)、女は全国値より若干低い値(0.90)となったが、死亡率では、男女とも、大阪府が全国より高かった(男 1.18、女 1.15)。大阪と全国の比較結果が、このように罹患率と死亡率で差異をもたらしている主な理由として、全国推計値の届出精度が大阪府がん登録のそれよりも良好なこと、大阪府のがん患者の生存率が全国のそれに

比し低い可能性が考えられる。もし、大阪府のがん患者の生存率が全国と差がないとすれば、大阪の罹患数が、実際より小さめになっていることが、この結果から推測される。一般に、届出ものの影響は、生存率の高い乳房、子宮、膀胱などで大きく、生存率の低い食道、肝、胆、膵、肺などで小さいと考えてよい。主要部位の罹患率について大阪と全国との比をみると、男女ともに1より大きかった部位は、肝、肺及びリンパ組織で、これらの部位の死亡率での比は、肝が極めて高い値であった。胃、結腸、直腸、胆のう、乳房、子宮、膀胱では、罹患率の比は1より小さかったが、死亡率では、男女の胆のう、膵臓、男の白血病、直腸を除きいずれも1を上回っていた。

表4 大阪府と全国の比較 - 年齢調整罹患率及び死亡率 - ;主要部位別、性別

- 1995年 -

部 位	年齢調整罹患率						年齢調整死亡率					
	男		女		大阪/全国		男		女		大阪/全国	
	大阪	全国	大阪	全国	男	女	大阪	全国	大阪	全国	男	女
全部位	264.6	262.0	149.5	166.5	1.01	0.90	183.9	156.5	87.5	76.3	1.18	1.15
食道	9.7	9.8	1.5	1.4	0.99	1.07	7.2	7.2	1.1	0.9	1.00	1.22
胃	56.1	67.1	22.1	27.9	0.84	0.79	34.2	31.1	14.1	12.9	1.10	1.09
結腸	23.8	30.7	14.5	17.8	0.78	0.81	11.5	10.1	7.4	6.8	1.14	1.09
直腸	13.4	16.7	6.6	8.3	0.80	0.80	6.8	6.9	3.6	3.1	0.99	1.16
肝臓	41.8	25.8	11.4	7.1	1.62	1.61	39.7	23.1	10.3	6.4	1.72	1.61
胆のう	6.5	6.9	5.2	6.0	0.94	0.87	5.7	5.8	4.7	4.8	0.98	0.98
膵臓	9.2	9.1	4.8	5.0	1.01	0.96	8.6	8.7	4.5	4.7	0.99	0.96
肺	42.1	36.5	13.1	10.1	1.15	1.30	37.5	31.7	11.0	8.5	1.18	1.29
乳房	-	-	26.2	29.3	-	0.89	-	-	8.4	7.5	-	1.12
子宮(1)	・	・	13.8	19.4	・	0.71	・	・	4.7	3.9	・	1.21
子宮(2)	・	・	11.4	12.7	・	0.90	・	・	4.7	3.9	・	1.21
膀胱	7.3	8.1	1.9	2.0	0.90	0.95	2.6	2.5	0.9	0.7	1.04	1.29
リンパ組織	7.8	6.2	4.2	3.7	1.26	1.14	5.7	5.3	3.0	2.9	1.08	1.03
白血病	5.7	4.4	3.4	3.5	1.30	0.97	3.7	4.3	2.5	2.5	0.86	1.00

全国年齢調整罹患率(推定値)は厚生省がん研究助成金による「地域がん登録」研究班が1993年の罹患率として推計したもの。推計に用いた7府県市の地域登録の届出精度は死亡者のみの割合が15.6%、罹患数/死亡数が1.83。これに対して大阪府(1995年)の前者が23.8%、後者が1.48(後述)。全国年齢調整死亡率は、1995年の人口動態死亡統計における悪性新生物 性、年齢階級別死亡率(日本人人口における)に基づいて算出した。

表5 年齢階級別罹患率(人口10万対):主部位別、性別

- 1995年 -

性	年齢階級	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(1)	膀胱	リンパ組織	白血病
男	0-14	14.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	-	・	0.0	1.2	5.3
	15-29	11.7	0.0	1.0	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	-	・	0.2	2.0	2.7
	30-39	38.3	0.0	9.2	3.3	1.3	3.4	0.7	0.5	2.2	-	・	1.1	2.5	2.9
	40-49	154.2	3.6	37.8	14.3	10.9	20.2	1.8	5.1	18.4	-	・	3.3	6.1	4.5
	50-59	468.0	24.8	114.7	44.6	30.6	77.8	8.9	17.0	54.7	-	・	9.5	13.3	6.1
	60-69	1284.9	56.6	267.6	115.4	70.1	287.4	28.3	43.9	189.4	-	・	29.7	29.9	12.6
	70-79	2278.4	75.5	488.2	213.4	96.5	300.3	67.6	88.6	464.9	-	・	74.9	53.4	21.0
	80-89	3396.8	98.6	683.5	294.1	154.2	281.4	128.8	131.9	759.8	-	・	163.7	103.3	28.6
女	0-14	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	3.3
	15-29	12.9	0.0	1.7	0.5	0.3	0.1	0.1	0.0	0.2	1.5	2.4	0.0	1.1	1.0
	30-39	67.5	0.0	7.8	2.6	1.5	0.7	0.6	0.4	3.3	23.7	20.6	0.6	1.5	2.0
	40-49	193.6	0.9	26.6	14.1	7.6	3.1	1.9	1.5	11.2	74.9	23.1	0.9	4.1	3.8
	50-59	307.1	3.8	42.2	34.1	16.4	14.7	8.3	7.6	19.0	73.0	33.5	2.3	5.9	5.0
	60-69	567.3	8.0	82.2	65.4	30.5	69.7	22.5	24.0	53.2	67.1	39.8	9.1	14.5	7.4
	70-79	1000.8	10.7	171.5	109.7	43.1	116.7	49.7	44.9	138.4	70.7	51.5	14.7	36.1	11.4
	80-89	1521.0	23.3	303.9	164.8	63.0	136.0	103.4	92.5	202.1	61.4	68.4	47.4	49.7	13.2

5) 年齢階級別罹患率

表 5 に、主要部位の罹患率を 10 歳年齢階級別（30 歳未満では 15 歳階級別）に示した。全がんの罹患率は、男では 15-29 歳が最も低く、その後は年齢とともに上昇し、女では加齢とともに上昇した。

部位別にみると、罹患率は、ほとんどの部位で加齢とともに急増した。乳がん(女)、子宮がんでは 30 歳代の急上昇が特徴的であった。

全がんでの年齢階級別罹患率を男女で比べると、0-14 歳では男の罹患率が女を上回ったが、15-29 歳から 40-49 歳までは女が上回った。50-59 歳以降は一貫して男の罹患率が女より大きかった。女の罹患率が男を上回るのは、そうした年齢階級で、女の乳がん及び子宮がん罹患率が大きいためである。

図 3 に、全がんの年齢階級別罹患率の推移を示した。男女ともに、1984-86 年頃までほとんどの年齢階級で緩やかな上昇傾向を示し、その後 59 歳以下の年齢階級では減少傾向に転じたが、1990-92 以降水平となった。60 歳以上では、1984-86 年以降も、緩やかな上昇傾向を継続、あるいは、水平に推移した。

主要部位別、10 歳階級別の罹患数及び罹患率を、付表 2-A 及び 2-B に示した。

図 3 全がん年齢階級別罹患率の年次推移;性別





図4 年齢階級別罹患数の上位3位までの部位とその割合



(6)年齢階級別部位分布

年齢階級別に罹患の上位3位までの部位とその割合を図4に示した。年齢階級は、0-4歳、5-14歳、15-24歳、・・・、75-84歳、85歳以上に分け、25歳以上については、性別に示した。

25歳以上の成人のがんでは、男では、罹患第1位は、74歳までは胃がん、75歳以上では肺がんとなった。女では、34歳までは子宮がん、64歳までは乳がん、それ以上では胃がんが1位となった。

なお、性・年齢階級別罹患順位5位までの部位について、罹患数、罹患率及び罹患割合を付表3に示した。

(7)地域別年齢調整罹患率

大阪府を、8二次医療圏（大阪市、豊能、三島、北河内、中河内、南河内、堺市、泉州）、その内大阪市をさらに4基本保健医療圏に区分し、計11地域について年齢調整罹患率を主要部位別、性別に求め、表6に示した。ここでは、罹患率が大阪府の罹患率の95%信頼区間の上限より高かった場合に*を、また下限より低かった場合に#を付した。成績の解釈にあたっては、毎年の罹患の傾向とその地域の届出精度(表7、8)とをあわせ、分析する必要があることに留意されたい。

地域別、主要部位別、性別の罹患数と年齢調整罹患率を、付表4-A、4-Bに、地域別の全がんの性、年齢階級別罹患数を付表5に、また、市区町村別、主要部位別、性別の罹患数と標準化罹患比を付表6-A、6-Bに、それぞれ示した。

表6 11 地域別調整罹患率（人口10万対）；主要部位別、性別

- 1995年 -

性別	地域	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮 (1)	膀胱	リンパ組織	白血病
男	大阪府	264.6	9.7	56.1	23.8	13.4	41.8	6.5	9.2	42.1	-	・	7.3	7.8	5.7
	大阪市	275.2 *	10.3	55.6	23.9	13.3	47.6 *	7.5 *	8.8	45.0 *	-	・	8.0	6.9 #	5.0
	市北部	268.9 *	11.8 *	48.2 #	23.1	12.8	44.6 *	8.2 *	8.4	45.8 *	-	・	10.6 *	7.6	3.9 #
	市西部	286.3 *	8.6 #	60.3 *	24.8	11.9 #	46.5 *	8.5 *	9.7	45.9 *	-	・	6.8	9.1 *	6.8 *
	市東部	272.7 *	11.2 *	55.2	23.5	14.7 *	50.8 *	7.1	7.9 #	42.8	-	・	6.4 #	5.7 #	4.2 #
	市南部	275.5 *	9.3	57.8	24.6	13.0	47.5 *	7.0	9.4	45.8 *	-	・	8.1 *	6.3 #	5.5
	大阪府下	259.2 #	9.5	56.3	23.7	13.5	39.1 #	6.0	9.4	40.6	-	・	7.0	8.2	6.0
	北部	250.9 #	10.5	55.5	26.4 *	14.4 *	32.0 #	5.2 #	10.3 *	34.4 #	-	・	6.2 #	8.7 *	5.2
	豊能	253.6 #	11.4 *	55.6	28.8 *	15.9 *	34.0 #	4.8 #	9.0	29.9 #	-	・	6.6 #	7.2	4.9
	三島	247.3 #	9.3	55.4	23.0	12.3 #	29.1 #	5.7 #	12.0 *	40.9	-	・	5.5 #	10.7 *	5.7
	東部	262.6	9.0	57.9	22.8	14.2	41.1	7.0	8.6	41.0	-	・	7.4	7.5	5.7
	北河内	259.1 #	8.7 #	58.0	24.3	14.8 *	39.4 #	7.3 *	8.9	38.5 #	-	・	7.5	6.8 #	4.6 #
	中河内	266.9	9.5	57.9	21.1 #	13.5	43.2	6.5	8.1 #	44.0 *	-	・	7.3	8.2	7.1 *
	南部	262.5	9.1	55.6	22.5	12.3 #	42.5	5.7 #	9.4	44.6 *	-	・	7.1	8.6	6.9 *
	南河内	271.7 *	8.3 #	55.1	21.0 #	13.9	43.4	7.4 *	6.8 #	48.5 *	-	・	8.0	7.7	5.6
	堺市	268.6	9.6	57.7	22.8	12.7	42.3	3.8 #	10.4 *	46.7 *	-	・	7.4	9.4 *	7.7 *
	泉州	249.3 #	9.3	54.1 #	23.3	10.6 #	41.8	6.0	10.6 *	39.5 #	-	・	6.1 #	8.6	7.2 *
女	大阪府	149.5	1.5	22.1	14.5	6.6	11.4	5.2	4.8	13.1	26.2	13.8	1.9	4.2	3.4
	大阪市	155.8 *	1.7	22.2	14.4	6.4	13.9 *	5.6	4.8	15.4 *	26.6	16.5 *	2.0	3.8	2.1 #
	市北部	152.4	1.7	23.8 *	14.8	5.4 #	15.2 *	4.3 #	5.5 *	14.7 *	22.9 #	18.6 *	1.6	4.5	2.1 #
	市西部	165.6 *	2.5 *	20.9 #	14.5	7.5 *	13.8 *	5.1	5.5 *	14.2 *	28.2 *	19.7 *	3.6 *	3.1 #	3.0
	市東部	154.0 *	0.9 #	20.8 #	15.7 *	6.2	14.8 *	6.9 *	4.6	16.4 *	26.9	15.9 *	2.1	3.2 #	1.7 #
	市南部	154.7 *	2.0 *	23.1	13.2 #	6.6	12.6 *	5.9 *	4.2 #	15.8 *	28.1 *	14.0	1.4 #	3.9	2.0 #
	大阪府下	146.1 #	1.4	22.2	14.6	6.7	10.1 #	5.0	4.8	11.9 #	25.9	12.6 #	1.9	4.4	4.0
	北部	140.8 #	1.5	21.9	15.8 *	6.7	9.1 #	5.2	5.1	10.3 #	23.9 #	12.0 #	2.3 *	3.9	3.7
	豊能	141.9 #	1.8	21.4	16.0 *	7.1	9.5 #	5.3	5.0	10.0 #	26.9	12.4 #	2.4 *	2.6 #	3.5
	三島	138.9 #	1.1 #	22.4	15.4	6.2	8.4 #	5.2	5.1	10.7 #	19.5 #	11.3 #	2.1	5.8 *	3.9
	東部	149.5	1.5	23.7 *	15.0	6.8	11.2	5.4	5.1	13.2	24.7 #	12.1 #	1.6	4.2	3.8
	北河内	146.9	1.5	25.2 *	16.3 *	6.8	10.4 #	5.2	4.4	13.1	23.1 #	11.5 #	1.7	4.2	4.1 *
	中河内	152.8 *	1.4	21.9	13.2 #	7.0	12.3 *	5.9 *	5.8 *	13.2	27.0	13.1	1.5 #	4.0	3.3
	南部	147.4	1.3	21.2	13.5 #	6.6	9.8 #	4.4 #	4.3	12.1 #	28.4 *	13.4	1.8	4.9 *	4.3 *
	南河内	159.3 *	0.9 #	21.8	13.6 #	8.1 *	10.3 #	4.1 #	4.2 #	11.7 #	33.2 *	19.1 *	1.9	4.1	5.7 *
	堺市	151.4	1.6	22.6	14.7	7.7 *	8.7 #	5.3	3.5 #	12.2 #	33.0 *	12.0 #	1.7	5.4 *	3.0
	泉州	134.3 #	1.3	19.5 #	12.5 #	4.4 #	10.5 #	3.8 #	5.0	12.3	20.3 #	10.0 #	1.9	5.1 *	4.3 *

* : 大阪府の罹患率の + 1.96 S E (95%信頼区間の上限) 以上の罹患率。

: 大阪府の罹患率の - 1.96 S E (95%信頼区間の下限) 以下の罹患率。

2. 登録の精度

(1) 届出の精度

表7に、届出精度の推移を部位別に示した。ここに届出精度として示した「全罹患患者のうち死亡情報のみで登録された者(死亡票のみの者)」の割合(%)^{4,10)}が大きい場合には、生存患者に届出もれが生じていて、罹患数が実際より小さくなっていることを示唆する。1995年のこの割合は23.8%(前年は23.4%)であった。従来、国際的にこの割合は「20%以下」とされていたが、世界のがん登録の精度が向上してきており、近年にはおよそ「10%程度以下」であることが求められつつある¹⁰⁾。

大阪府がん登録での届出精度は、事業開始後次第に改善され、1987-89年には「死亡情報のみ」の割合が21.1%にまで低下したが、その後上昇に転じている。大阪府がん登録では、届出精度の改善が大きな課題であり、各医療機関の協力を得るための努力が一層必要である。

表8で、全がんでの「死亡情報のみ」の割合の推移を、患者の住所地別に示した。1995年では、11基本医療圏のうち3医療圏でこの割合が25%を越えていた。近年のがん患者の増加が著しいため、届出もれの患者が増加していることが考えられるが、各医療機関及び関係の諸先生方には一層の御協力をお願いしたい。主要部位別、性別の成績を、付表7に示した。

なお、国際的には死亡情報のみ患者では、がんという診断そのものが疑わしいとの認識もある。我が国のがん登録のように、病院内の病歴管理の仕組みが未発達で、届出もれが発生しやすい場合、死亡情報のみ患者が多くなることを避け難い。しかし、大阪府では、がん死亡者の95%までが病院内死亡であり、患者の医療情報(病理組織所見、手術年月日、手術内容、剖検所見など)が、死亡診断書の中にもしばしば記載されている。そこで、死亡情報のみ患者であっても、これらの情報が得られた場合には、診断の根拠となる医療情報が得られている届出患者同様に扱うこととすると、残る「死亡時の臨床診断名以外にがんを裏付ける情報が得られていない者」の割合は、付表7-右欄のようになった。

従来の定義による「死亡情報のみで登録されている患者」の中、約4割が、がんの診断を裏付ける医学情報を持っていた。残る真に「死亡診断名情報のみ」の割合は、1995年の全がん罹患数中の13.4%であった。

表7 死亡票のみの者の割合(%)の推移;主要部位別

- 男女計 -

部 位 罹 患 年	全 部 位	食 道	胃	結 腸	直 腸	肝 臓	胆 の う
1978-80	25.3	26.7	24.3	24.9	22.1	36.6	37.9
1981-83	21.7	21.1	20.3	20.3	18.1	32.2	31.7
1984-86	21.4	21.2	19.0	19.6	19.1	32.8	30.3
1987-89	21.1	19.9	19.3	19.3	17.0	30.7	28.8
1990-92	23.4	20.7	21.6	18.9	17.1	32.1	33.2
1995	23.8	19.8	22.5	19.1	17.8	34.8	32.5

部 位 罹 患 年	脾 臓	肺	乳 房	子 宮 (1)	膀 胱	リンパ ^o 組織	白血 病
1978-80	37.0	28.4	8.0	10.1	20.4	30.6	30.0
1981-83	31.2	26.5	7.3	8.3	16.4	22.9	26.9
1984-86	31.7	25.1	7.0	8.1	16.9	22.1	27.1
1987-89	33.2	25.5	6.1	8.2	15.8	20.7	26.0
1990-92	34.8	30.5	6.9	10.0	17.8	23.9	29.8
1995	37.1	29.4	7.5	11.8	18.1	24.2	22.4

表8 患者の住所地別にみた全がん「死亡票のみの者の割合」(%)の推移

- 男女計 -

地域 罹患年	大阪府	大阪市				北部		東部		南部		
		北部	西部	東部	南部	豊能	三島	北河内	中河内	南河内	堺市	泉州
1978-80	25.3	26.6	27.7	23.3	21.4	24.7	31.6	27.9	23.2	24.0	24.1	29.5
1981-83	21.7	23.1	24.6	19.2	20.0	17.8	35.0	21.4	20.9	19.5	19.7	25.7
1984-86	21.4	22.4	20.4	20.3	20.8	19.3	28.0	24.3	20.9	16.2	20.2	23.1
1987-89	21.1	22.2	20.6	20.5	20.4	18.8	25.9	25.0	19.7	17.3	18.5	23.9
1990-92	23.4	24.8	21.4	24.6	24.6	20.2	25.6	27.7	24.2	17.9	18.7	26.1
1995	23.8	24.3	21.6	26.0	22.2	20.5	27.7	24.6	24.5	21.4	19.5	30.5

(2) 診断の精度

がん登録における診断の精度を示す指標として、「医療機関から届出された患者のうち、細胞診又は組織診を受検した者の割合」を取り上げ、表9にその成績を示した。国際的には罹患数に対する割合を用いるが、日本では死亡情報のみの者が罹患者中の相当数を占めるため、この影響で上記の割合が低くなる。そこでこれを排除するため、届出患者数に対する割合をみることにした^{8,10)}。組織診には、生検時、手術時及び剖検時に行われた病理組織検査をすべて含めた。この割合は、1995年の全がんでは87.7%であった。肝、胆、膵以外の部位では、1987-89年以降90%を超えていた。

表9 細胞診又は組織診受検割合(%)の推移;主要部位別

- 届出患者, 男女計 -

部位 罹患年	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮 (1)	膀胱	リパ ^o 組織	白血病
1978-80	82.3	73.6	78.9	76.1	79.0	56.9	68.6	59.9	90.8	95.2	95.8	91.6	98.9	94.3
1981-83	86.1	82.7	88.4	83.4	87.3	53.3	74.3	65.6	92.2	95.6	97.9	94.6	99.1	96.7
1984-86	87.1	87.8	92.9	88.3	91.0	50.0	72.0	66.8	93.9	96.0	97.8	96.1	98.8	96.2
1987-89	88.3	91.7	94.7	90.8	94.5	53.0	74.9	65.7	94.6	96.6	98.2	96.8	98.4	97.5
1990-92	88.0	94.2	94.5	91.8	94.5	55.3	70.6	62.6	94.1	96.2	98.4	96.3	98.7	96.7
1995	87.7	95.1	95.1	91.9	95.2	51.6	65.6	58.0	93.1	95.3	96.8	96.4	99.6	98.8

リパ^o組織及び白血病では、骨髄穿刺及び末梢血検査を含めた。

1995年届出罹患患者の臨床進行度と受療状況

3. 受診の経緯

患者受診の経緯を、全部位及び7つの特定部位の届出患者について調べ、表10に示した。ここでは、「紹介なし」を「自主受診」、「紹介を受けた」を「医療機関経由」とし、「集検より」、「健康診断で」、及び、集検又は健診機関から届出された患者を「集検又は健診経由」群に含めることとした。届出票への記載は、通常、カルテの記載によるが、実際はそうであっても、カルテに記載されていないことがあるので、「医療機関経由」の患者、及び「集検又は健診経由」の患者の割合は、実際よりも過少に示されている恐れがあることに注意されたい。

表10では、受診の経緯が不明の者の割合を左欄に、判明者中の受診経緯別患者割合を右欄に示した。全がんでは受診の経緯が「不明」のものが10.0%存在した。なお、この割合には、年次による変化を殆ど認めていない。

判明者中の内訳では、全がんの場合、「医療機関経由」が51.6%、「自主受診」が35.4%、「集検

又は健診経由」が 3.0%となった。食道、肺、及び子宮がんで「医療機関経由」の割合が高く、「自主受診」が低かった。乳がんでは「自主受診」の割合が高かった(46.6%)。「集検又は健診経由」の患者は、大腸で最も高く(5.6%)、次いで、胃、子宮がん、乳房の順になった。

なお、特定部位別、11 地域別の成績を、付表 8 に示した。

表 11 では、「集検又は健診経由」の割合の推移を示した。「集検又は健診経由」の割合は、1987-89 年以降、胃で減少、大腸と肝で増加の傾向にあり、他の部位では大きな変化はなかった。

表 10 受診の経緯(%);特定部位別

部 位	届出患者数	受診の経緯 不明 (%)	- 届出患者、男女計、1995年 - 判明者中の分布(%)		
			医療機関 経由	自主受診	集検又は 健診経由
全部位	19,708	10.0	51.6	35.4	3.0
食道	575	12.5	59.0	26.4	2.1
胃	3,947	8.5	51.7	34.2	5.5
大腸	3,073	9.9	44.0	40.5	5.6
肝臓	2,040	8.8	46.2	43.1	1.9
肺	2,496	7.1	65.0	26.3	1.6
乳房	1,560	11.0	38.3	46.6	4.2
子宮(1)	770	8.3	61.8	25.5	4.4

表 11 受診の経緯、「集検又は健診経由」割合(%)の年次推移;特定部位別

部位 罹患年	- 男女計 -							
	全部位	食道	胃	大腸	肝臓	肺	乳房	子宮(1)
1978-80	4.2	1.9	5.8	0.7	0.1	2.1	1.2	21.9
1981-83	3.0	1.3	5.9	0.5	0.1	1.5	1.4	14.2
1984-86	2.8	1.2	7.8	0.8	0.2	1.8	2.2	3.6
1987-89	3.8	2.8	9.9	3.1	0.9	2.2	4.5	4.5
1990-92	3.7	1.9	7.8	5.2	1.1	2.2	5.4	4.4
1995	3.0	2.1	5.5	5.6	1.9	1.6	4.2	4.4

注：判明者中における割合。

4 . 臨床進行度分布

診断時の臨床進行度(病巣の拡がり)を、主要部位別に表 12 に示した。がんが原発巣内に「限局」していた者(上皮内がんを含む)、「所属リンパ節転移」のみがあった者、「隣接臓器浸潤」があった者、遠隔に転移または浸潤が及んでいた者(「遠隔転移」)の 4 群に分類し、判明者中での臨床進行度分布を右欄に、臨床進行度が「不明」の者の割合を左欄に示した。但し、1 人の患者について複数の届出票がある場合、初発時に主要な治療を担当した医療機関から届出の臨床進行度を優先して採用した。

臨床進行度「不明」の者が、全がんでは 12.8%(前年 11.6%)であり、部位別には、肝、リンパ組織を除いて全て 20%以下となった。

全がんの臨床進行度分布については、「限局」の者が 45.4%、「所属リンパ節転移」17.3%、「隣接臓器浸潤」14.8%、「遠隔転移」22.4%となり、前年とほとんど変化なかった。部位別に「限局」の割合をみると、比較的予後の良い乳房、子宮及び膀胱で、それぞれ 59.3%、53.5%及び 79.2%と高かったが、予後不良の肝臓でも 64.6%と高かった。また、胃、直腸及び結腸では 46.2~55.1%となっ

たが、胆、膵、肺及びリンパ組織では低かった。一方、「遠隔転移」の割合は、乳房、子宮及び膀胱で小さく、膵、肺及びリンパ組織ではそれぞれ45.7%、38.6%、58.7%と大きかった。

なお、性別、主要部位別臨床進行度分布を付表9に、また、特定部位別、11地域別の成績を付表10に示した。地域別の集計では、「所属リンパ節転移」と「隣接臓器浸潤」とをあわせ、がんが領域に広がっている者の割合（「領域浸潤」）として示した。

表13では、主要部位について、臨床進行度判明者中の「限局」患者割合の推移を示した。多くの部位で年次とともに増加しつつあり、1990-92年に比較して特に胃、結腸において増加した。一方、子宮では「限局」の患者割合が減少していた。

表12 臨床進行度分布(%)；主要部位別

部 位	届出患者数	- 届出患者，男女計，1995年 -				
		臨床進行度 不明 (%)	判明者中の分布(%)			
			限局	所属リンパ 節転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移
全部位	19,708	12.8	45.4	17.3	14.8	22.4
食道	575	10.4	29.7	24.7	23.5	22.1
胃	3,947	10.4	46.2	22.2	12.4	19.1
結腸	2,025	9.8	55.1	19.3	7.9	17.6
直腸	1,048	7.3	47.6	24.7	11.0	16.7
肝臓	2,040	26.0	64.6	3.8	13.9	17.6
胆のう,胆管	540	17.4	26.2	9.9	40.6	23.3
膵臓	583	16.0	12.2	8.6	33.5	45.7
肺	2,496	10.5	20.6	20.8	20.1	38.6
乳房	1,560	5.4	59.3	31.4	3.9	5.5
子宮(1)	770	6.1	61.5	6.9	24.3	7.2
子宮(2)	645	7.3	53.5	8.4	29.4	8.7
膀胱	466	8.2	79.2	4.0	9.6	7.2
リンパ組織	529	21.7	22.2	11.4	7.7	58.7

表13 限局患者の割合(%)の推移；主要部位別

部位 罹患年	- 届出患者，男女計 -													
	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮 (1)	子宮 (2)	膀胱	リンパ 組織
1978-80	33.8	29.5	27.5	29.3	34.5	30.8	16.5	8.1	17.9	46.4	72.5	64.2	73.9	17.0
1981-83	35.4	26.3	30.5	30.2	37.5	35.9	14.6	7.3	17.8	51.6	73.1	66.3	76.5	14.4
1984-86	38.2	27.5	36.9	35.0	36.9	52.4	16.5	7.9	16.5	50.5	72.9	65.6	77.6	17.9
1987-89	41.9	29.9	41.3	41.1	44.3	62.8	21.0	9.1	18.2	55.7	69.8	61.2	82.3	18.8
1990-92	43.1	29.8	41.7	47.5	46.3	63.6	23.7	10.1	18.7	57.0	74.4	65.9	82.7	19.6
1995	45.4	29.7	46.2	55.1	47.6	64.6	26.2	12.2	20.6	59.3	61.5	53.5	79.2	22.2

5. 検査及び治療

(1) 部位別比較

表14に、主要部位別に届出患者の新発生時の検査受検、入院及び受療の各割合を示した。再発のがんに対する検査、治療は含まれない。1人の患者について2件以上の届出があった場合には、それらを通覧して得た情報により集計した。また、治療については、手術、放射線療法及び化学療法(ホルモン療法を含む)の3種を取り上げ、併用療法を受けた者では、それぞれの治療方法ごとに重複して計上した。

全がんでの受検割合は、X線検査が86.2%と高く、次いで組織診、超音波、内視鏡の順であった。入院割合は92.5%(1993年94.1%)であった。全がんでの手術割合は1993年と同じ58.3%であった。部位別にみた手術割合は、直腸で最も高く(90.5%)、肝臓、肺で低かった(15.4%、28.4%)。放射線の受療割合は全がんで13.7%であったが、食道では42.3%と最も高く、子宮(36.6%)、乳房(27.7%)、

肺(26.6%)、リンパ組織(22.7%)でも比較的多かった。

表 14 最右欄に「特異療法なし又は治療方法不明」の者の割合を示した。この群には、届出患者のうち治療の情報を得ていない者、対症療法にとどまった者などを含めた。この割合は、全がんで 22.7%であったが、肝、胆、膵の各がんで 40%以上と大きく、肺がんで 30.8%を占めていた。

部位別の検査受検割合を付表 11 に、また、入院及び受療割合を付表 12 にそれぞれ示した。

表 14 受検、入院及び受療割合(%);主要部位別

- 届出患者、男女計、1995年 -

部 位	受検割合							入院割合	受療割合				
	X線	内視鏡	アイソトープ	超音波	細胞診	組織診	細胞診又は組織診		手術	放射線	化学療法	特異療法なし又は治療方法不明	
全部位	86.2	59.1	23.0	71.6	44.8	82.6	87.7	92.5	58.3	13.7	43.4	22.7	
食道	87.0	82.1	14.4	72.7	38.4	94.4	95.1	89.6	52.5	42.3	36.7	16.7	
胃	86.3	89.7	5.1	82.6	38.3	94.2	95.1	94.0	74.0	1.0	40.5	19.9	
結腸	86.7	80.0	4.5	75.4	27.1	91.2	91.9	92.5	85.5	0.7	41.0	12.7	
直腸	88.8	85.8	5.3	79.9	32.4	94.8	95.2	96.2	90.5	4.9	49.9	8.0	
肝臓	91.0	52.9	14.5	93.5	13.9	48.1	51.6	96.0	15.4	2.3	40.1	50.2	
胆のう	92.8	60.0	8.9	93.5	38.1	53.9	65.6	96.9	46.5	5.2	27.0	42.6	
膵臓	88.5	63.8	10.5	88.0	36.5	46.8	58.0	94.7	39.3	6.0	25.4	47.7	
肺	95.8	64.0	62.3	48.8	82.7	71.8	93.1	94.3	28.4	26.6	42.6	30.8	
乳房	81.4	4.6	32.5	80.3	66.3	93.5	95.3	90.7	87.7	27.7	69.2	7.8	
子宮(1)	81.7	47.0	23.9	50.6	82.6	92.6	96.8	88.6	71.0	36.6	32.6	7.9	
膀胱	82.2	79.6	23.2	58.6	85.4	94.4	96.4	94.8	88.0	7.3	46.6	10.1	
リンパ組織	84.5	37.2	54.4	72.0	51.8	99.4	99.6	88.5	19.8	22.7	69.6	19.1	
白血病	71.5	16.6	11.0	48.8	71.5	80.1	98.8	92.3	2.8	6.4	76.7	21.8	

(2) 手術実施割合の推移

表 15 に主要部位の手術実施割合の推移を示した。いくつかの部位で手術割合が若干減少傾向にあった。これは、高齢患者の増加も一つの要因と思われるが、今後の経過をみる必要がある。

表 15 手術実施割合 (%) の推移

- 届出患者、男女計 -

部位 罹患年	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮 (1)	子宮 (2)	膀胱	リンパ 組織
1978-80	58.1	48.3	71.5	80.3	84.5	11.8	54.6	50.6	21.1	94.2	68.7	62.7	84.3	31.1
1981-83	60.5	51.7	75.4	84.3	88.5	17.5	50.9	46.7	23.7	95.5	71.8	67.1	86.0	31.5
1984-86	60.3	50.0	77.4	86.6	86.8	21.3	48.5	45.3	24.6	92.4	74.2	69.6	86.3	30.4
1987-89	60.1	50.4	77.3	85.6	88.3	24.4	48.6	43.6	24.8	92.2	72.5	68.1	87.4	31.3
1990-92	58.1	54.2	74.4	85.0	90.5	18.2	42.8	40.9	23.5	90.7	74.6	69.6	87.8	24.9
1995	58.3	52.5	74.0	85.5	90.5	15.4	46.5	39.3	28.4	87.7	71.0	67.8	88.0	19.8

(3) 11 地域別比較

表 16 には、内視鏡、細胞診又は組織診受検割合、入院及び手術割合を、患者住所地の 2 次及び基本医療圏(11 地域)別に示した。本報告では、全部位及び男女計での上位 5 部位までを取り上げることとした。部位ごとに、11 地域中最も高い率を示した 2 地域の数値に * を、最も低い率を示した 2 地域の数値に # を付した。なお、これらの数値の解釈にあたっては、毎年の傾向を点検するほか、地域別の届出医療機関の性格、特性の違いにも留意する必要がある。

特定部位についての、患者の住所地(11 地域)別、検査種類別受検割合を付表 13 に、受療割合を付表 14 に示した。

表 1 6 1 1 地域別受検、入院及び手術割合(%);特定部位別

- 届出患者、男女計、1995年 -

地域	内視鏡						細胞診又は組織診					
	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房
大阪府	59.1	89.7	80.0	52.9	64.0	4.6	87.7	95.1	91.9	51.6	93.1	95.3
大阪市	56.8	88.2	78.7	50.1	60.7	4.5	86.1	94.1	90.1	49.9	93.0	95.5
市北部	59.7	89.0	86.3 *	51.3	62.3	7.8	87.9	92.4 #	92.8	56.3	93.6	94.2
市西部	57.2	90.6	75.9	46.4	57.3	8.3 *	86.9	95.1	85.7 #	53.6	94.9 *	97.6 *
市東部	56.5	90.9	78.0	45.9 #	56.4	0.8 #	85.0 #	94.6	88.4 #	49.5	93.4	96.6
市南部	55.2 #	84.9 #	75.6 #	54.3	64.3	3.3	85.4 #	94.3 #	91.6	45.1 #	91.5	94.5
大阪府下	60.3	90.5	80.6	54.8	66.0	4.7	88.5	95.6	92.8	52.7	93.2	95.2
北部	56.5	87.5	75.3	50.8	56.7	2.6	89.1	96.0	93.6	57.1	93.9	92.7
豊能	53.2 #	85.3 #	73.9 #	42.2 #	54.5 #	0.5 #	88.4	94.9	93.9 *	51.8	93.8	94.2
三島	61.9	91.0	77.9	67.3 *	59.1	7.1	90.1	97.8 *	93.1	67.3 *	93.9	89.3 #
東部	61.5	92.0	82.7	59.9	60.3	7.3	87.0	95.1	92.2	49.8	90.6	94.7
北河内	63.8 *	92.1 *	82.0	61.6 *	64.9	8.4 *	87.2	95.7	93.3	50.7	90.4 #	92.2 #
中河内	58.9	91.8 *	83.7	57.9	54.8 #	6.1	86.8	94.3 #	90.8	48.7	90.8 #	97.5
南部	62.0	91.3	83.0	53.0	75.3	3.9	89.4	95.8	92.6	52.6	95.1	97.2
南河内	61.3	90.9	83.3	50.6	72.2	4.4	90.8 *	95.1	93.8 *	55.6	94.4	97.5
堺市	62.3	91.4	85.5 *	54.8	78.1 *	5.0	90.8 *	95.5	93.6	62.2 *	96.7 *	98.3 *
泉州	62.5 *	91.3	80.2	53.2	75.0 *	1.7	86.3	96.6 *	90.7	37.8 #	93.5	95.0

地域	入院						手術					
	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房
大阪府	92.5	94.0	92.5	96.0	94.3	90.7	58.3	74.0	85.5	15.4	28.4	87.7
大阪市	91.8	94.0	93.5	95.5	93.4	90.1	56.6	73.9	85.8	13.4	26.7	87.1
市北部	93.3	94.3	95.4	96.8	95.1	89.3	57.6	71.1	88.2	14.6	30.9 *	82.5 #
市西部	92.8	95.1	95.5	97.1	93.6	88.1	56.2	76.8	84.8	13.8	23.6 #	86.9
市東部	90.5	91.6 #	91.3	94.5 #	91.7 #	84.7 #	56.0 #	75.8	83.2 #	9.2 #	25.3 #	83.1
市南部	91.4	94.7	92.9	94.9 #	93.6	95.1	56.6	72.9	86.6	15.7	26.6	92.3
大阪府下	92.8	94.0	92.1	96.4	94.8	91.0	59.1	74.1	85.4	16.7	29.5	88.0
北部	89.8	91.3	86.3	97.0	93.0	87.5	56.2	64.0	77.0	11.2	34.8	84.2
豊能	89.4 #	90.1 #	87.9 #	96.0	93.8	89.4	59.9	67.0 #	84.8	12.1	43.3 *	87.3
三島	90.3 #	93.2	83.4 #	99.0 *	92.1	83.3 #	49.9 #	59.1 #	62.8 #	9.6 #	25.6	77.4 #
東部	92.1	94.0	93.6	96.7	93.3	88.0	59.2	76.9	87.6	17.4	27.7	85.1
北河内	92.4	92.3	91.4	97.8 *	94.5	86.0	57.8	74.9	87.3	15.3	27.8	82.7
中河内	91.9	96.0	96.7 *	95.4	92.0 #	90.2	60.7 *	79.5 *	88.0	19.8	27.6	87.7
南部	95.5	96.1	95.5	95.6	97.0	95.2	61.1	78.7	90.4	19.4	28.3	92.4
南河内	96.1 *	97.1 *	97.2 *	96.3	95.4	96.2 *	64.6 *	82.1 *	91.7 *	21.9 *	26.4	93.7 *
堺市	95.3 *	94.7	96.5	95.2	96.7 *	96.7 *	59.5	75.7	89.0	17.0	30.5	93.9 *
泉州	95.1	96.6 *	93.0	95.5	99.5 *	91.6	59.4	78.8	90.7 *	19.9 *	27.2	88.2

注：11地域中最も高率の2地域の数値に*、最も低率の2地域の数値に#を付した。

(4) 年齢階級別比較

表 17 には、年齢階級別の受検、入院割合及び手術割合を特定部位について示した。入院割合は、80歳以上の年齢階級でも、全ての部位においてより若い年齢階級と同様高率(90%以上)であった。

内視鏡、細胞診または組織診、及び手術の割合では、高齢者で低下傾向がみられた。特に80歳以上の高齢で低下が著しかった。

表 1 7 年齢階級別受検、入院及び手術割合(%);特定部位別

- 届出患者、男女計、1995年 -

年齢階級	内視鏡						細胞診又は組織診					
	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房
全年齢	59.1	89.7	80.0	52.9	64.0	4.6	87.7	95.1	91.9	51.6	93.1	95.3
30-39	37.8	88.6	76.0	43.8	73.9	1.7	96.3	97.1	100.0	87.5	100.0	94.9
40-49	48.7	89.3	81.8	58.8	68.6	4.5	94.1	98.6	96.4	58.8	96.2	96.6
50-59	60.6	90.1	78.0	57.1	74.5	4.4	91.0	96.8	93.3	54.9	97.8	94.9
60-69	65.2	91.4	83.4	54.4	71.8	5.8	87.8	96.7	94.0	53.3	97.0	95.3
70-79	64.0	88.2	79.3	53.7	65.1	4.4	85.9	94.1	91.8	48.0	91.8	95.0
80+	52.0	87.7	74.9	31.3	34.3	8.6	76.7	87.1	80.8	36.3	82.4	90.0

年齢階級	入院						手術					
	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房	全部位	胃	結腸	肝臓	肺	乳房
全年齢	92.5	94.0	92.5	96.0	94.3	90.7	58.3	74.0	85.5	15.4	28.4	87.7
30-39	90.5	100.0	92.0	100.0	91.3	87.3	74.9	88.6	88.0	56.3	26.1	87.3
40-49	92.0	92.8	87.3	94.8	96.8	91.3	72.5	80.2	84.2	14.4	37.8	90.1
50-59	92.4	93.6	89.1	97.6	94.6	91.4	67.2	80.2	85.8	22.9	37.2	87.4
60-69	92.6	93.6	93.3	95.9	94.6	89.1	59.6	79.4	88.5	16.8	37.5	86.1
70-79	93.3	94.7	95.2	95.9	94.0	92.5	54.0	73.6	88.7	9.8	25.8	87.4
80+	92.2	94.4	94.9	95.0	93.1	90.0	34.5	43.4	71.8	1.9	3.8	78.6

6 . 手術内容

表 18 に、手術を受けた患者で手術内容が不明の者の割合、及び、判明者中の手術内容別患者割合を示した。全がんでは、手術内容が不明の者は 7.2% あった。部位別には、胆、肝、膵、肺、食道及びリンパ組織で 10% 以上となった。手術内容が判明している者で内訳をみると、全がんの場合、治癒切除が 77.7% (前年 75.8%)、非治癒切除 16.7% (前年 16.3%)、吻合など 3.5%、単開腹など 2.1% であった。治癒切除の割合を部位別にみると、乳房、子宮で 88~92% と高く、結腸、直腸、膀胱でも 78~81% と高かった。肝、胆、肺では 55~71% であったが、手術を受けた者の割合が、既述のように特に肝と肺では低いため、これらの部位では、届出患者全体に対する治癒切除の割合は低くとどまった。膵がんでは、手術を受けたものも 39.3% と少なかったが、治癒切除の割合も 33% と他の部位に比べ著しく低かった。部位別、性別の成績を付表 15 に示した。

表 18 手術内容(%);主要部位別

- 届出患者, 男女計, 1995年 -

部 位	手術数	手術内容				
		不明 (%)	治癒切除	非治癒切除	吻合など	単開など
全部位	11,480	7.2	77.7	16.7	3.5	2.1
食道	302	10.9	74.7	20.4	3.0	1.9
胃	2,921	5.2	76.8	16.6	3.9	2.8
結腸	1,732	4.4	81.1	15.2	2.9	0.8
直腸	948	5.1	78.3	15.9	4.1	1.7
肝臓	314	15.6	69.8	22.3	3.0	4.9
胆のう	251	16.3	53.3	23.8	12.9	10.0
膵臓	229	15.3	33.0	23.2	33.5	10.3
肺	710	11.0	71.2	24.4	3.0	1.4
乳房	1,368	4.5	91.5	8.5	0.0	0.0
子宮(1)	547	6.0	90.9	8.4	0.0	0.8
子宮(2)	437	7.1	88.4	10.6	0.0	1.0
膀胱	410	5.6	80.1	17.3	1.8	0.8
リンパ組織	105	20.0	50.0	41.7	3.6	4.8

表 19 では、主要部位について、手術患者での手術内容判明者中の治癒切除の割合推移を示した。治癒切除の割合は、殆ど全ての部位で次第に向上しつつあるが、特に、肝、肺、結腸での増加が顕著であった。

表 19 治癒切除患者の割合 (%) の推移;主要部位別

- 届出患者, 男女計 -

部位 罹患年	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮 (1)	子宮 (2)	膀胱	リンパ組織
1978-80	64.1	47.0	60.5	63.0	64.1	23.5	26.9	11.9	52.1	91.2	94.3	92.3	78.3	37.8
1981-83	67.2	55.8	64.6	63.6	67.5	31.8	27.9	17.4	60.3	92.6	93.6	91.7	79.6	37.6
1984-86	68.7	58.1	69.0	64.8	70.0	36.0	37.7	21.2	62.0	92.6	93.6	91.5	80.7	40.7
1987-89	71.0	63.5	71.7	70.0	76.5	39.7	43.2	23.9	64.2	94.4	92.7	90.2	81.8	43.8
1990-92	73.2	65.6	72.3	74.1	76.1	60.2	52.0	28.5	62.8	93.4	91.3	87.9	78.7	45.2
1995	77.7	74.7	76.8	81.1	78.3	69.8	53.3	33.0	71.2	91.5	90.9	88.4	80.1	50.0

1991年届出罹患者の生存率

7. 5年相対生存率

(1) 部位別生存率と年次推移

表 20 に、1991 年罹患者のうち大阪府在住の届出患者について、5 年相対生存率を求め、1978 年以降の 3 年毎 4 期間の成績とあわせ示した。

1991 年の全がん患者の生存率は 41.0% で、1987-89 年のそれより 0.2 ポイント低かった。部位別には、乳房、子宮及び膀胱のがん患者が 67～81% の高い生存率を示し、胃、結腸、直腸、卵巣、前立腺及びリンパ組織では、34～57% と全がんでのそれに近い中等度の生存率を示した。これらに対し肝、胆、膵及び肺では 4～17% と依然低い生存率にとどまっていた。付表 16 に、1991 年罹患者届出患者についての性別、部位別 5 年相対生存率を、観察数及び標準誤差とともに示した。

(2) 臨床進行度別生存率

表 21 に、臨床進行度別 5 年相対生存率を示した。全部位では、病巣が原発臓器、組織に「限局」していた患者の生存率は 73.5%、「所属リンパ節転移」群では 48.7%、「隣接臓器浸潤」群では 14.1%、「遠隔転移」群では 7.5% で、「限局」では 1990 年の患者のそれより 0.6 ポイント低かった。

部位別に「限局」群の生存率をみると、胃、結腸、直腸、乳房、子宮、膀胱で 86～94% と高かった。肝及び膵では、22～25% と「限局」の患者であってもなお極めて低い生存率にとどまっていた。

表 20 5年相対生存率(%)の推移;
主要部位別, 1978-1991 年

部位/罹患者年	- 届出患者、男女計 -				
	1978-80	1981-83	1984-86	1987-89	1991
全部位	34.0	36.9	38.2	41.2	41.0
食道	9.6	12.6	10.8	14.7	16.8
胃	33.8	38.9	43.1	47.2	44.5
結腸	36.7	41.0	45.5	53.3	56.0
直腸	38.1	43.9	45.4	52.4	56.5
肝臓	3.3	3.5	7.8	9.1	13.1
胆のう	7.0	6.8	7.4	11.3	11.0
膵臓	2.4	2.7	2.9	4.9	3.8
肺	9.8	10.3	11.2	11.7	13.5
乳房	69.8	80.1	78.5	83.3	81.1
子宮(2)	63.8	68.3	71.4	67.0	66.9
卵巣	32.0	31.0	34.4	37.5	42.5
前立腺	48.1	54.7	44.1	51.9	40.7
膀胱	59.7	66.0	63.7	75.0	73.5
リンパ組織	27.0	28.6	31.6	34.8	33.6
白血病	15.5	19.9	20.9	23.2	27.7

表 21 臨床進行度別 5年相対生存率(%) ;
主要部位別, 1991 年

部 位	観察数	- 届出患者、男女計 -				
		限局	所属リンパ ^o 節転移	隣接臓器 浸潤	遠隔 転移	進行度 不明
全部位	12,419	73.5	48.7	14.1	7.5	18.9
食道	311	42.1	16.3	5.1	2.5	12.5
胃	2,686	86.1	41.5	8.8	1.2	18.3
結腸	1,183	91.0	64.6	26.9	5.5	29.3
直腸	664	88.5	60.1	15.7	12.0	15.7
肝臓	1,458	21.9	2.7	5.4	2.8	7.8
胆のう	346	40.7	23.7	3.1	-	6.1
膵臓	380	24.7	-	2.0	0.8	3.6
肺	1,369	47.2	17.9	7.2	1.5	8.7
乳房	950	94.3	78.3	70.2	10.3	26.7
子宮(2)	431	86.3	46.5	46.7	6.8	19.6
膀胱	245	90.7	-	-	-	46.7

．1995年のがん死亡率とがん患者の死亡時の医療

8．死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率


(1) 主要部位別がん死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率

人口動態統計による大阪府(総人口)の1995年の部位別がん死亡数、粗死亡率及び年齢調整死亡率を表22に示し、死亡数と同年の罹患数を比較した。また、付表17には部位別死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率、死亡割合及び平均死亡年齢を示し、付表18-A、18-Bには主要部位の性別、10歳年齢階級別死亡数及び率を、付表19-A、19-Bには主要部位の性別、11地域別死亡数及び年齢調整死亡率を示した。

1995年の大阪府のがん死亡総数は、男女計で18,914人、粗死亡率は215.0、年齢調整死亡率は128.6となった。性別に、部位別死亡数の割合を図5で見ると、男では、肝(2,508人)が1位で、次いで肺(2,370人)、胃(2,156人)の順となった。女では、胃(1,231人)、肺(982人)、大腸(956人)となり、順位は、男女とも変化がなかった。なお、図5では、死亡数の最も多い部位から順に10位までをとり上げ、部位別死亡割合を示した。また、結腸と直腸とを一括して大腸と表示した。

図5 死亡数の割合;主要10部位別、性別

A. 男



B. 女




表22右欄で「罹患数の死亡数に対する比」をみると、全がんでは1.48、「死亡数の罹患数に対する比」は0.68となった。前者は厚生省がん研究助成金による「地域がん登録」研究班において、また後者はIARCが5年ごとに出版している「5大陸のがん罹患」において、それぞれ届出精度を示す一つの指標として取り上げられている。なお後者は、生存率を反映する指標として便宜的に利用できる。

部位別に「罹患数の死亡数に対する比」をみると、乳房、子宮、膀胱で高く(2.94～2.14)、肝、胆、膵、肺では1.2以下と低かった。

表 2 2 罹患及び死亡数、粗率、年齢調整率(人口 10 万対)及び罹患数と死亡数の比;主要部位別

- 男女計、1995年 -

部 位	数		粗率		年齢調整率		罹患数 /死亡数	死亡数 /罹患数
	罹患	死亡	罹患	死亡	罹患	死亡		
全部位	27,973	18,914	313.7	215.0	195.8	128.6	1.48	0.68
食道	758	566	8.6	6.4	5.2	3.9	1.34	0.75
胃	5,367	3,387	61.0	38.5	37.2	22.7	1.58	0.63
結腸	2,379	1,368	27.0	15.6	16.3	9.1	1.74	0.58
直腸	1,292	732	14.7	8.3	9.0	5.0	1.77	0.57
肝臓	3,590	3,381	40.8	38.4	25.5	23.8	1.06	0.94
胆のう	875	784	10.0	8.9	5.7	5.1	1.12	0.90
膵臓	1,010	958	11.5	10.9	6.7	6.3	1.05	0.95
肺	3,794	3,352	43.1	38.1	25.3	22.0	1.13	0.88
乳房	1,743	593	19.8	6.7	13.6	4.4	2.94	0.34
子宮(2)	818	382	9.3	4.3	6.1	2.6	2.14	0.47
膀胱	635	255	7.2	2.9	4.2	1.6	2.49	0.40
リンパ組織	797	614	9.1	7.0	5.8	4.2	1.30	0.77
白血病	451	364	5.1	4.1	4.5	3.0	1.24	0.81

(2)年齢調整死亡率の年次推移


表 23、図 6 に主要部位の年齢調整死亡率の年次推移を性別に示した。なお、1995 年から死亡診断書が改訂されたこと及び ICD-10 が適用され分類体系や原死因選択ルールに大きな変更があったことにより¹⁶⁾、悪性新生物死亡が急激に増加した。悪性新生物死亡の年次推移を観察する場合、この点に十分配慮する必要がある。また、図では、1993 年、1994 年の死亡率が表示されていないことに注意を要する。全部位の男では 1969-71 年以降緩やかな上昇傾向を示し、女では緩やかな減少傾向を示した。男女の胃及び子宮がんの死亡率は減少傾向にあった。男の肝がんは、1969-71 年以降上昇を続けていたが、近年横這い傾向にある。女では、1975-77 年に最も低値となり以後上昇に転じたが、ごく最近には再び減少の兆しがある。直腸がんは、男では 1984-86 年に、女では 1981-83 年にそれぞれピークがあり、以降わずかながら減少傾向を示した。その他図示した多くの部位では、緩やかな増加傾向がみられた。年齢調整罹患率の推移と比べると、男女の胃、子宮がんの死亡率の減少は罹患率の減少を上回っていた。また、結腸、前立腺、乳房(女)の各がんでは、罹患率の増加に比べ、死亡率の増加は緩やかであった。

表 23 . 年齢調整死亡率の年次推移 ; 主要部位別、性別

A.男														- 1995年 -	
部位 罹患年	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(2)	前立腺	膀胱	リンパ組織	白血病
1966-68	173.3	8.9	80.9	3.5	4.6	16.1	1.5	5.2	18.6	-	・	2.1	3.7	4.0	3.3
1969-71	154.0	8.3	69.2	4.3	5.1	14.3	2.0	4.9	18.5	-	・	1.7	2.4	3.3	3.5
1972-74	154.8	8.0	64.2	4.0	5.5	15.7	2.2	5.0	21.7	-	・	2.5	2.8	3.9	3.4
1975-77	158.7	7.7	57.8	5.5	6.0	18.9	2.8	5.3	26.2	-	・	2.2	2.6	4.5	4.1
1978-80	165.5	6.7	53.2	6.3	6.1	23.8	3.6	6.4	29.0	-	・	2.5	3.1	4.8	4.1
1981-83	172.8	6.3	49.3	7.3	6.6	30.2	4.3	7.4	31.2	-	・	2.5	2.9	5.1	4.5
1984-86	179.9	6.7	44.6	8.4	7.0	34.2	5.0	7.7	34.6	-	・	3.4	2.8	5.6	4.6
1987-89	182.5	6.9	41.1	9.1	6.6	37.3	5.7	8.6	35.9	-	・	3.6	2.9	5.2	4.7
1990-92	181.1	7.5	36.8	10.2	6.6	37.3	5.5	9.0	37.5	-	・	3.6	2.7	5.3	4.4
1994	175.6	7.2	34.1	10.1	6.4	35.9	5.3	8.5	36.2	-	・	3.8	3.0	5.3	4.4
1995	183.9	7.2	34.2	11.5	6.8	39.7	5.7	8.6	37.5	-	・	4.5	2.6	5.7	3.7

B.女														- 1995年 -	
部位 罹患年	全部位	食道	胃	結腸	直腸	肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮(2)	前立腺	膀胱	リンパ組織	白血病
1966-68	109.6	3.0	40.4	2.7	3.6	7.0	1.2	2.6	5.7	4.9	17.4	・	1.5	1.8	2.4
1969-71	97.9	2.6	35.5	3.1	3.5	6.1	2.0	2.8	5.6	4.7	13.9	・	1.0	1.8	2.7
1972-74	97.7	2.1	33.4	3.7	3.3	6.3	2.5	2.9	6.8	5.6	12.5	・	1.0	2.2	2.7
1975-77	92.2	1.8	28.7	4.1	3.4	5.8	2.9	3.3	7.1	5.8	11.2	・	0.9	2.2	3.0
1978-80	91.4	1.7	26.2	4.7	3.5	6.4	3.4	3.8	8.3	5.7	9.6	・	0.9	2.5	2.8
1981-83	90.2	1.6	22.5	5.4	3.8	7.3	3.8	4.1	8.9	6.5	8.1	・	0.8	2.5	3.1
1984-86	90.9	1.4	21.3	5.6	3.6	8.2	5.2	4.4	9.7	6.7	6.5	・	1.0	2.9	2.7
1987-89	88.7	1.3	18.3	6.4	3.3	8.5	5.1	4.9	10.4	6.8	5.5	・	0.9	2.8	3.0
1990-92	86.5	1.3	16.0	7.0	3.3	9.1	5.1	4.8	10.5	7.0	5.0	・	0.7	3.0	2.7
1994	81.6	1.2	13.1	7.0	2.6	8.3	4.6	4.8	10.6	7.5	4.1	・	0.8	2.9	2.6
1995	87.5	1.1	14.1	7.4	3.6	10.3	4.7	4.5	11.0	8.4	4.7	・	0.9	3.0	2.5

図 6 年齢調整死亡率の年次推移;主要部位別、性別




(3)年齢階級別死亡率の年次推移

全がんによる年齢階級別死亡率の年次推移を図7に示した。

男女共に80歳以上の高齢者では死亡率が増加する傾向を示したが、女の70歳以下、男の30歳以下の年齢階級では、減少傾向が観察された。年齢階級別罹患率の推移と重ね合わせると、これらの年齢階級で、罹患率に比べ死亡率が低く抑制されていることがわかる。

図7 全がんの年齢階級別死亡率の年次推移;性別



5.9 . がん患者の死亡時の医療

扱1) がん死亡者の剖検実施割合

〇 剖検情報は、がん登録にとって、資料の質を高めるために重要な情報である。これにより、生前の臨床診断名や原発部位が変更されることもある。

表24に、届出及び死亡両情報から判明した剖検実施数と、その全がん死亡数に対する割合とを示した。府立成人病センタ - 調査部では、剖検輯報¹⁷⁾との照合を実施しており、府内剖検例の大多数を入力し得たと考える。しかし、剖検輯報では患者同定情報が不十分なため、輯報に掲載されていても、登録資料と照合できなかった例が存在した。

がん死亡者中の剖検実施割合は、全がんで6.0%で、前年では5.8%であった。この割合は白血病で16.3%と最も高く、次いでリンパ組織、肝、膵となっている。

表 2 4 がん死亡者における剖検実施数及び割合(%);主要部位別

- 死亡者、男女計、1995年 -					
部 位	死亡数	剖検数	部 位	死亡数	剖検数 (%)
全部位	20,164	1,202 (6.0)	肺	3,519	221 (6.3)
食道	608	36 (5.9)	乳房	637	17 (2.7)
胃	3,647	147 (4.0)	子宮(2)	410	15 (3.7)
結腸	1,435	51 (3.6)	卵巣	262	14 (5.3)
直腸	837	29 (3.5)	前立腺	320	14 (4.4)
肝臓	3,518	282 (8.0)	膀胱	310	7 (2.3)
胆のう	793	45 (5.7)	リンパ組織	649	90 (13.9)
膵臓	981	74 (7.5)	白血病	374	61 (16.3)

(2) がん死亡者の死亡場所

死亡情報に基づいて、がん死亡者の死亡場所を3年毎の年次別に調べると、表 25 のようになった。病院で死亡するがん患者の割合は、1978-80 年には 86.9%であったが、次第に増加し、1990-92 年には 95.2%、1995 年には 94.1%となった。一方自宅死亡の割合は、1978-80 年には 10.7%であったが、1995 年では 4.6%であった。

表 2 5 死亡場所の分布(%)

- 死亡者、男女計 -					
死亡年	死亡数 (年平均)	死亡場所の分布(%)			
		病院	診療所	自宅	その他
1978-80	10,487	86.9	1.7	10.7	0.7
1981-83	11,823	90.8	1.5	7.1	0.5
1984-86	13,471	92.8	1.4	5.4	0.4
1987-89	14,861	94.5	1.2	4.0	0.3
1990-92	16,060	95.2	1.0	3.5	0.3
1995	18,914	94.1	0.8	4.6	0.4

謝 辞

大阪府悪性新生物患者登録事業にご協力いただいている大阪府医師会及び大阪府内全ての医療機関ならびに保健所と市区町村に対し、深く感謝致します。

また、コホート生存率表をご提供いただいた国立がんセンター調査課に謝意を表します。

本報告についての照会、要望などは、大阪府立成人病センター調査課登録係(電話 06-972-1181 内線 2302) 又は大阪府医師会地域医療一課(電話 06-763-7012)へご連絡願います。

なお、データ処理、集計、解析及び記述は、大阪府立成人病センター調査課登録係が担当した。

文 献

- 1) 厚生省大臣官房統計情報部編：疾病，傷害及び死因統計分類提要，1995年版．厚生省統計情報部，東京，1995．
- 2) 厚生省大臣官房統計情報部編：国際疾病分類 - 腫瘍学，第二版．厚生省統計協会，東京，1993．
- 3) Fujimoto I, Hanai A, Oshima A, Sakaue F, Matsuo S, Hirata H, Yoshida M, Hiyama T, Tsukuma H: Record linkage in the Osaka Cancer Registry and its application in cancer epidemiology. In Blot WJ et al. (eds) Statistical Methods in Cancer Epidemiology. RERF, Hiroshima, 129-141, 1985.
- 4) Jensen OM, Parkin DM, Maclennan R, Muir CS and Skeet RG: Cancer Registration, Principles and Methods. IARC Scientific Publications No.95, IARC, Lyon, 1991.
- 5) 味木和喜子他：地域がん登録における多重がんの定義と判定基準 - 多重がん判定の症例集 - ．厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究」班(主任研究者，花井彩)，大阪，1996．
- 6) 大阪府環境保健部，大阪府医師会，大阪府立成人病センター：大阪府におけるがん登録第 49 報 - 大阪府がん患者の 5 年生存率とその推移 - 1975-83 年 - ．大阪府環境保健部，大阪，1991．
- 7) 厚生省大臣官房統計情報部編：疾病，傷害及び死因統計分類提要，1979 年版．厚生省統計情報部，東京，1978．
- 8) 藤本伊三郎編：地域がん登録の手引き．厚生省がん研究助成金「がん予防におけるがん登録の役割に関する研究」班（主任研究者 福岡誠吾），千葉，1986.
- 9) 総理府統計局：1995 年国勢調査報告第 2 巻，その 2 - 27，大阪府．総理府統計局，東京，1996.
- 10) Parkin DM, Whelan SL, Ferlay J, Roymond L and Young J eds: Cancer Incidence in Five Continents, Vol. , IARC Scientific Publications No.143, IARC, Lyon, 1997.
- 11) 日本癌治療学会：日本癌治療学会・生存率算出規約．金原出版，1985.
- 12) 有本弘子他：Cohort 生存率表について．厚生指標，32，25-30, 1985．
- 13) 味木和喜子他：地域がん登録における生存率計測の標準方式の検討．癌の臨床，44，9，981-993，1998.
- 14) 大阪成人病予防協会：大阪府におけるがん患者の生存率 1975-89 年．篠原出版，1998
- 15) The Research Group for Population-based Cancer Registration in Japan : Cancer Incidence and Incidence Rates in Japan in 1992-93 : Estimates Based on Data from Seven Population-based Cancer Registries, Japanese Journal of Clinical Oncology 28,10, 641-647,1998.
- 16) 厚生統計協会：国民衛生の動向・厚生指標，臨時増刊・44，9，1997.
- 17) 日本病理学会編：日本病理剖検輯報第 38 輯（1995 年度剖検例集載）．日本病理剖検輯報刊行会，東京，1996.

付表目次

頁

付表 1	がん罹患数及び罹患率 A：がん罹患数、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対） 及び累積罹患率（人口1000対）；部位別、性別 ----- B：罹患割合（％）、届出と診断の精度及び罹患時平均年齢； 部位別、性別 -----	
付表 2	年齢階級別罹患数及び率；主要部位別、性別 A：罹患数 ----- B：罹患率（人口10万対） -----	
付表 3	年齢階級別罹患順位 - 罹患数、罹患率（人口10万対）及び罹患割合（％） -----	
付表 4	11地域別罹患数及び年齢調整罹患率；主要部位別、性別 A：罹患数 ----- B：年齢調整罹患率（人口10万対） -----	
付表 5	全がん11地域別年齢階級別罹患数；性別 -----	
付表 6	市区町村別罹患数、標準罹患比；主要部位別、性別 A：罹患数 ----- B：標準化罹患比 -----	
付表 7	届出精度（死亡情報のみで登録されている者の罹患数に対する割合）（％）； 部位別、性別 -----	
付表 8	11地域別部位別受診の経緯（％）；特定部位別 -----	
付表 9	臨床進行度分布（％）；部位別、性別 -----	
付表10	地域別臨床進行度分布（％）；特定部位別 -----	
付表11	受検割合（％）；部位別 -----	
付表12	入院及び受療割合（％）；部位別 -----	
付表13	11地域別受検割合（％）；特定部位別 -----	
付表14	11地域別受療割合（％）；特定部位別 -----	
付表15	手術患者の手術内容（％）；部位別、性別 -----	
付表16	5年相対生存率（％）；部位別、性別 -----	
付表17	がん死亡数、粗死亡率、年齢調整死亡率（人口10万対） 死亡割合（％）及び死亡時平均年齢；部位別、性別 -----	
付表18	年齢階級別死亡数及び率；主要部位別、性別 A：死亡数 ----- B：死亡率（人口10万対） -----	
付表19	11地域別死亡数及び年齢調整死亡率；主要部位別、性別 A：死亡数 ----- B：年齢調整死亡率（人口10万対） -----	
付表20	大阪府推計人口；性別，年齢階級別 -----	
付表21	大阪府推計人口；性別，11地域別 -----	
付表22	標準人口 -----	